

Atlas ornithologique de la Casamance

| | | |
|--|--|---|
| Agrobate podobé (<i>Cercotrichas podobe</i>) | Autour unibande (<i>Kaupifalco monogrammicus</i>) | Bulbul à gorge blanche (<i>Phyllastrephus albigularis</i>) |
| Aigle botté (<i>Hieraaetus pennatus</i>) | Avocette élégante (<i>Recurvirostra avosetta</i>) | Bulbul à gorge claire (<i>Atimastillas flavicollis</i>) |
| Aigle couronné (<i>Stephanoaetus coronatus</i>) | Bagadais casqué (<i>Prionops plumatus</i>) | Bulbul à queue rousse (<i>Pyrrhurus scandens</i>) |
| Aigle d'Ayres (<i>Aquila ayresii</i>) | Balbuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>) | Bulbul des jardins (<i>Pycnonotus barbatus</i>) |
| Aigle de Wahlberg (<i>Hieraaetus wahlbergi</i>) | Barbican à poitrine rouge (<i>Pogonornis dubius</i>) | Bulbul des raphias (<i>Thescelocichla leucopleura</i>) |
| Aigle fascié (<i>Aquila spilogaster</i>) | Barbican de Vieillot (<i>Lybius vieilloti</i>) | Bulbul fourmilier (<i>Bleda canicapillus</i>) |
| Aigle huppard (<i>Lophaetus occipitalis</i>) | Barbion à croupion jaune (<i>Pogoniulus bilineatus</i>) | Bulbul verdâtre (<i>Eurillas virens</i>) |
| Aigle martial (<i>Polemaetus bellicosus</i>) | Barbion à front jaune (<i>Pogoniulus chrysoconus</i>) | Busard cendré (<i>Circus pygargus</i>) |
| Aigle ravisseur (<i>Aquila rapax</i>) | Barge à queue noire (<i>Limosa limosa</i>) | Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>) |
| Aigrette à gorge blanche (<i>Egretta gularis</i>) | Barge rousse (<i>Limosa lapponica</i>) | Busard pâle (<i>Circus macrourus</i>) |
| Aigrette ardoisée (<i>Egretta ardesiaca</i>) | Bateleur des savanes (<i>Terathopius ecaudatus</i>) | Busautour des sauterelles (<i>Butastur rufipennis</i>) |
| Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>) | Baza coucou (<i>Aviceda cuculoides</i>) | Buse d'Afrique (<i>Buteo auguralis</i>) |
| Akalat à ailes rousses (<i>Illadopsis rufescens</i>) | Beaumarquet aurore (<i>Pytilia phoenicoptera</i>) | Buse variable (<i>Buteo buteo</i>) |
| Akalat brun (<i>Illadopsis fulvescens</i>) | Bécasseau cocorli (<i>Calidris ferruginea</i>) | Caille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>) |
| Akalat de Puvel (<i>Illadopsis puveli</i>) | Bécasseau maubèche (<i>Calidris canutus</i>) | Calao à bec noir (<i>Lophoceros nasutus</i>) |
| Alcin des chauves-souris (<i>Macheiramphus alcinus</i>) | Bécasseau minute (<i>Calidris minuta</i>) | Calao à bec rouge (<i>Tockus erythrorhynchus</i>) |
| Alecto à bec blanc (<i>Bubalornis albirostris</i>) | Bécasseau sanderling (<i>Calidris alba</i>) | Calao brévibande (<i>Lophoceros semifasciatus</i>) |
| Alouette de Java (<i>Mirafra cantillans</i>) | Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>) | Calao siffleur (<i>Bycanistes fistulator</i>) |
| Amadine cou-coupé (<i>Amadina fasciata</i>) | Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>) | Camaroptère à tête grise (<i>Camaroptera brachyura</i>) |
| Amarante du Sénégal (<i>Lagonosticta senegala</i>) | Bécassine sourde (<i>Lymnocyptes minimus</i>) | Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>) |
| Amarante foncé (<i>Lagonosticta rubricata</i>) | Becbleu sanguin (<i>Spermophaga haematina</i>) | Capucin bec-d'argent (<i>Lonchura cantans</i>) |
| Amarante pointé (<i>Lagonosticta rufopicta</i>) | Bengali zébré (<i>Amandava subflava</i>) | Capucin nonnette (<i>Spermestes cucullata</i>) |
| Amarante vineux (<i>Lagonosticta vinacea</i>) | Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>) | Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>) |
| Anaplecte à ailes rouges (<i>Anaplectes leuconotos</i>) | Bergeronnette pie (<i>Motacilla aguimp</i>) | Chevalier arlequin (<i>Tringa erythropus</i>) |
| Anhinga d'Afrique (<i>Anhinga rufa</i>) | Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>) | Chevalier cul-blanc (<i>Tringa ochropus</i>) |
| Anserelle naine (<i>Nettapus auritus</i>) | Bihoreau à dos blanc (<i>Gorsachius leuconotos</i>) | Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>) |
| Apalis à gorge jaune (<i>Apalis flavida</i>) | Bihoreau gris (<i>Nycticorax nycticorax</i>) | Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>) |
| Astrild à joues orange (<i>Estrilda melpoda</i>) | Blongios de Sturm (<i>Ixobrychus sturmi</i>) | Chevalier stagnatile (<i>Tringa stagnatilis</i>) |
| Astrild cendré (<i>Estrilda troglodytes</i>) | Blongios nain (<i>Ixobrychus minutus</i>) | Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>) |
| Astrild queue-de-vinaigre (<i>Estrilda coerulescens</i>) | Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>) | Chevêchette perlée (<i>Glaucidium perlatum</i>) |
| Astrild-caille à lunettes (<i>Ortygospiza atricollis</i>) | Bruant à ventre jaune (<i>Emberiza affinis</i>) | Choucador à longue queue (<i>Lamprotornis caudatus</i>) |
| Autour de Toussenel (<i>Accipiter toussenelii</i>) | Bruant de Gosling (<i>Emberiza goslingi</i>) | Choucador à oreillons bleus (<i>Lamprotornis chalybaeus</i>) |
| Autour gabar (<i>Micronisus gabar</i>) | Brubru africain (<i>Nilaurifer</i>) | Choucador à queue violette (<i>Lamprotornis chalcurus</i>) |
| Autour sombre (<i>Melierax metabates</i>) | Bucorve d'Abyssinie (<i>Bucorvus abyssinicus</i>) | Choucador à ventre roux (<i>Lamprotornis pulcher</i>) |

Atlas ornithologique de la Casamance

| | | |
|---|---|---|
| Choucador de Swainson (<i>Lamprotornis chloropterus</i>) | Coucal noir (<i>Centropus grillii</i>) | Épervier des Ovampos (<i>Accipiter ovampensis</i>) |
| Choucador pourpré (<i>Lamprotornis purpureus</i>) | Coucou africain (<i>Cuculus gularis</i>) | Épervier shikra (<i>Accipiter badius</i>) |
| Choucador splendide (<i>Lamprotornis splendidus</i>) | Coucou de Klaas (<i>Chrysococcyx klaas</i>) | Érémomèle à dos vert (<i>Eremomela pusilla</i>) |
| Chouette-pêcheuse de Pel (<i>Scotopelia scoti</i>) | Coucou de Levailant (<i>Clamator levaillantii</i>) | Étourneau améthyste (<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>) |
| Cigogne à pattes noires (<i>Ciconia microscelis</i>) | Coucou didric (<i>Chrysococcyx caprius</i>) | Euplecte à dos d'or (<i>Euplectes macroura</i>) |
| Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>) | Coucou foliotocol (<i>Chrysococcyx cupreus</i>) | Euplecte franciscain (<i>Euplectes franciscanus</i>) |
| Cigogne noire (<i>Ciconia nigra</i>) | Coucou geai (<i>Clamator glandarius</i>) | Euplecte monseigneur (<i>Euplectes hordeaceus</i>) |
| Circaète brun (<i>Circaetus cinereus</i>) | Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>) | Euplecte vorabé (<i>Euplectes afer</i>) |
| Circaète cendré (<i>Circaetus cinerascens</i>) | Coucou solitaire (<i>Cuculus solitarius</i>) | Faucon à cou roux (<i>Falco ruficollis</i>) |
| Circaète de Beaudouin (<i>Circaetus beaudouini</i>) | Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>) | Faucon ardoisé (<i>Falco ardosiaceus</i>) |
| Circaète Jean-le-Blanc (<i>Circaetus gallicus</i>) | Courlis corlieu (<i>Numenius phaeopus</i>) | Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>) |
| Cisticole à ailes courtes (<i>Cisticola brachypterus</i>) | Courvite à ailes bronzées (<i>Rhinoptilus chalconotus</i>) | Faucon crécerellette (<i>Falco naumanni</i>) |
| Cisticole à dos noir (<i>Cisticola eximius</i>) | Courvite de Temminck (<i>Cursorius temminckii</i>) | Faucon de Cuvier (<i>Falco cuvierii</i>) |
| Cisticole chanteuse (<i>Cisticola cantans</i>) | Crabier chevelu (<i>Ardeola ralloides</i>) | Faucon lanier (<i>Falco biarmicus</i>) |
| Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>) | Cratérope à tête noire (<i>Turdoides reinwardtii</i>) | Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>) |
| Cisticole du Nil (<i>Cisticola marginatus</i>) | Cratérope brun (<i>Turdoides plebejus</i>) | Faucon sacre (<i>Falco cherrug</i>) |
| Cisticole rousse (<i>Cisticola rufus</i>) | Crécerelle renard (<i>Falco alopex</i>) | Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>) |
| Cisticole siffleuse (<i>Cisticola lateralis</i>) | Crombec sittelle (<i>Sylvietta brachyura</i>) | Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>) |
| Cochevis huppé (<i>Galerida cristata</i>) | Crombec vert (<i>Sylvietta virens</i>) | Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>) |
| Cochevis modeste (<i>Galerida modesta</i>) | Cubla de Gambie (<i>Dryoscopus gambensis</i>) | Fauvette passerinette (<i>Sylvia cantillans</i>) |
| Colombar à front nu (<i>Treron calvus</i>) | Dendrocygne veuf (<i>Dendrocygna viduata</i>) | Flamant nain (<i>Phoeniconaias minor</i>) |
| Colombar waalia (<i>Treron waalia</i>) | Drongo brillant (<i>Dicrurus adsimilis</i>) | Flamant rose (<i>Phoenicopus ruber</i>) |
| Combassou de Wilson (<i>Vidua wilsoni</i>) | Drongo de Ludwig (<i>Dicrurus ludwigii</i>) | Fou brun (<i>Sula leucogaster</i>) |
| Combassou du Cameroun (<i>Vidua camerunensis</i>) | Échasse blanche (<i>Himantopus himantopus</i>) | Fou de Bassan (<i>Morus bassanus</i>) |
| Combassou du Sénégal (<i>Vidua chalybeata</i>) | Échenilleur à épaulettes rouges (<i>Campephaga poinea</i>) | Francolin à double éperon (<i>Pternistis bicalcaratus</i>) |
| Combattant varié (<i>Calidris pugnax</i>) | Échenilleur à ventre blanc (<i>Coracina pectoralis</i>) | Francolin d'Ahanta (<i>Pternistis ahantensis</i>) |
| Corbeau pie (<i>Corvus albus</i>) | Effraie des clochers (<i>Tyto alba</i>) | Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>) |
| Cordonbleu à joues rouges (<i>Uraeginthus bengalus</i>) | Élanion blanc (<i>Elanus caeruleus</i>) | Gallinule africaine (<i>Gallinula angulata</i>) |
| Cormoran africain (<i>Microcarbo africanus</i>) | Elminie bleue (<i>Elminia longicauda</i>) | Gallinule poule-d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>) |
| Corvinelle à bec jaune (<i>Corvinella corvina</i>) | Engoulevent à balanciers (<i>Caprimulgus longipennis</i>) | Ganga à ventre brun (<i>Pterocles exudus</i>) |
| Cossyphé à calotte blanche (<i>Cossypha albicapillus</i>) | Engoulevent à longue queue (<i>Caprimulgus climacurus</i>) | Ganga quadribande (<i>Pterocles quadricinctus</i>) |
| Cossyphé à calotte neigeuse (<i>Cossypha niveicapilla</i>) | Engoulevent terne (<i>Caprimulgus inornatus</i>) | Gladiateur de Blanchot (<i>Malaconotus blanchoti</i>) |
| Coucal à ventre blanc (<i>Centropus leucogaster</i>) | Épervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>) | Glaréole à collier (<i>Glareola pratincola</i>) |
| Coucal du Sénégal (<i>Centropus senegalensis</i>) | Épervier de Hartlaub (<i>Accipiter erythropus</i>) | Gobemouche des marais (<i>Muscicapa aquatica</i>) |

Atlas ornithologique de la Casamance

| | | |
|--|--|--|
| Gobemouche drongo (<i>Melaenornis edoloides</i>) | Guifette noire (<i>Chlidonias niger</i>) | Jacana à poitrine dorée (<i>Actophilornis africanus</i>) |
| Gobemouche gris (<i>Muscicapa striata</i>) | Gymnogène d'Afrique (<i>Polyboroides typus</i>) | Labbe parasite (<i>Stercorarius parasiticus</i>) |
| Gobemouche mésange (<i>Myioparus plumbeus</i>) | Héron à bec jaune (<i>Ardea brachyrhyncha</i>) | Labbe pomarin (<i>Stercorarius pomarinus</i>) |
| Gobemouche noir (<i>Ficedula hypoleuca</i>) | Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>) | Locustelle tachetée (<i>Locustella naevia</i>) |
| Gobemouche pâle (<i>Agricola pallidus</i>) | Héron garde-bœufs (<i>Bubulcus ibis</i>) | Loriot doré (<i>Oriolus auratus</i>) |
| Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>) | Héron goliath (<i>Ardea goliath</i>) | Mahali à calotte marron (<i>Plocepasser superciliosus</i>) |
| Goéland cendré (<i>Larus canus</i>) | Héron mélanocéphale (<i>Ardea melanocephala</i>) | Malcoha à bec jaune (<i>Ceuthmochares aereus</i>) |
| Goéland d'Audouin (<i>Larus audouinii</i>) | Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>) | Marabout d'Afrique (<i>Leptoptilos crumeniferus</i>) |
| Goéland dominicain (<i>Larus dominicanus</i>) | Héron strié (<i>Butorides striata</i>) | Marouette à bec jaune (<i>Zapornia flavirostra</i>) |
| Goéland leucophée (<i>Larus michahellis</i>) | Hirondelle à ailes tachetées (<i>Hirundo leucosoma</i>) | Marouette de Baillon (<i>Zapornia pusilla</i>) |
| Goéland railleur (<i>Larus genei</i>) | Hirondelle à longs brins (<i>Hirundo smithii</i>) | Marouette poussin (<i>Zapornia parva</i>) |
| Gonolek de Barbarie (<i>Laniarius barbarus</i>) | Hirondelle à ventre roux (<i>Cecropis semirufa</i>) | Martin-chasseur à poitrine bleue (<i>Halcyon malimbica</i>) |
| Gonolek de Turati (<i>Laniarius turatii</i>) | Hirondelle de fenêtre (<i>Delichon urbicum</i>) | Martin-chasseur à tête grise (<i>Halcyon leucocephala</i>) |
| Gonolek souffré (<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>) | Hirondelle de Guinée (<i>Hirundo lucida</i>) | Martin-chasseur du Sénégal (<i>Halcyon senegalensis</i>) |
| Gorgebleue à miroir (<i>Cyanecula svecica</i>) | Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>) | Martin-chasseur strié (<i>Halcyon chelicuti</i>) |
| Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>) | Hirondelle des mosquées (<i>Cecropis senegalensis</i>) | Martin-pêcheur azuré (<i>Alcedo quadibrachys</i>) |
| Grand Indicateur (<i>Indicator indicator</i>) | Hirondelle fanti (<i>Psalidoprocne obscura</i>) | Martin-pêcheur géant (<i>Megaceryle maxima</i>) |
| Grand Labbe (<i>Stercorarius skua</i>) | Hirondelle paludicole (<i>Riparia paludicola</i>) | Martin-pêcheur huppé (<i>Corythornis cristatus</i>) |
| Grand-duc de Verreaux (<i>Bubo lacteus</i>) | Hirondelle rousseline (<i>Cecropis daurica</i>) | Martin-pêcheur pie (<i>Ceryle rudis</i>) |
| Grand-duc du Sahel (<i>Bubo cinerascens</i>) | Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>) | Martin-pêcheur pygmée (<i>Ceyx pictus</i>) |
| Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>) | Huïtrier pie (<i>Haematopus ostralegus</i>) | Martinet cafre (<i>Apus caffer</i>) |
| Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>) | Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>) | Martinet d'Ussher (<i>Telacanthura ussheri</i>) |
| Grébifoulque d'Afrique (<i>Podica senegalensis</i>) | Hylia verte (<i>Hylia prasina</i>) | Martinet des maisons (<i>Apus affinis</i>) |
| Grue couronnée (<i>Balearica pavonina</i>) | Hylote à ventre jaune (<i>Hylia flavigaster</i>) | Martinet des palmes (<i>Cypsiurus parvus</i>) |
| Guêpier à gorge blanche (<i>Merops albicollis</i>) | Hypolaïs ictérine (<i>Hippolais icterina</i>) | Martinet noir (<i>Apus apus</i>) |
| Guêpier à gorge rouge (<i>Merops bulocki</i>) | Hypolaïs obscure (<i>Iduna opaca</i>) | Martinet pâle (<i>Apus pallidus</i>) |
| Guêpier à queue d'aronde (<i>Merops hirundineus</i>) | Hypolaïs polyglotte (<i>Hippolais polyglotta</i>) | Mélocichle à moustaches (<i>Melocichla mentalis</i>) |
| Guêpier d'Europe (<i>Merops apiaster</i>) | Ibis falcinelle (<i>Plegadis falcinellus</i>) | Merle africain (<i>Turdus pelios</i>) |
| Guêpier d'Orient (<i>Merops orientalis</i>) | Ibis hagedash (<i>Bostrychia hagedash</i>) | Mésange galonnée (<i>Melaniparus guineensis</i>) |
| Guêpier de Perse (<i>Merops persicus</i>) | Ibis sacré (<i>Threskiornis aethiopicus</i>) | Milan à bec jaune (<i>Milvus migrans parasitus</i>) |
| Guêpier écarlate (<i>Merops nubicus</i>) | Indicateur tacheté (<i>Indicator maculatus</i>) | Milan noir (<i>Milvus migrans</i>) |
| Guêpier nain (<i>Merops pusillus</i>) | Irrisor moqueur (<i>Phoeniculus purpureus</i>) | Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>) |
| Guifette leucoptère (<i>Chlidonias leucopterus</i>) | Irrisor noir (<i>Rhinopomastus aterrimus</i>) | Moineau gris (<i>Passer griseus</i>) |
| Guifette moustac (<i>Chlidonias hybrida</i>) | Jabiru d'Afrique (<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>) | Moinelette à oreillons blancs (<i>Eremopterix leucotis</i>) |

Atlas ornithologique de la Casamance

| | | |
|--|--|--|
| Monticole bleu (<i>Monticola solitarius</i>) | Pie-grièche à tête rousse (<i>Lanius senator</i>) | Rollier d'Abyssinie (<i>Coracias abyssinicus</i>) |
| Mouette à tête grise (<i>Larus cirrocephalus</i>) | Pie-grièche méridionale (<i>Lanius meridionalis</i>) | Rollier varié (<i>Coracias naevius</i>) |
| Mouette rieuse (<i>Larus ridibundus</i>) | Pigeon biset (<i>Columba livia</i>) | Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>) |
| Nicator du Sénégal (<i>Nicator chloris</i>) | Pigeon roussard (<i>Columba guinea</i>) | Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>) |
| Nigrette à ventre roux (<i>Nigrita bicolor</i>) | Pintade de Numidie (<i>Numida meleagris</i>) | Rousserolle africaine (<i>Acrocephalus scirpaceus baeticatus</i>) |
| Noircap loriot (<i>Hypergerus atriceps</i>) | Pipit à dos uni (<i>Anthus leucophrys</i>) | Rousserolle effarvate (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>) |
| Océanite tempête (<i>Hydrobates pelagicus</i>) | Pipit à gorge rousse (<i>Anthus cervinus</i>) | Rousserolle turdoïde (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) |
| Oie-armée de Gambie (<i>Plectropterus gambensis</i>) | Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>) | Sarcidiorne à bosse (<i>Sarkidiornis melanotos</i>) |
| Ombrette africaine (<i>Scopus umbretta</i>) | Pipit rousseline (<i>Anthus campestris</i>) | Sentinelle à gorge jaune (<i>Macronyx croceus</i>) |
| Honore à huppe blanche (<i>Tigriornis leucolopha</i>) | Piquebœuf à bec jaune (<i>Buphagus africanus</i>) | Serin à croupion blanc (<i>Serinus leucopygius</i>) |
| Ouette d'Égypte (<i>Alopochen aegyptiaca</i>) | Pluvier fluvial (<i>Pluvianus aegyptius</i>) | Serin du Mozambique (<i>Crithagra mozambica</i>) |
| Outarde à ventre noir (<i>Lissotis melanogaster</i>) | Pluvier à collier interrompu (<i>Charadrius alexandrinus</i>) | Souimanga à collier (<i>Hedydipna collaris</i>) |
| Outarde du Sénégal (<i>Eupodotis senegalensis</i>) | Pluvier à front blanc (<i>Charadrius marginatus</i>) | Souimanga à longue queue (<i>Cimmyris pulchellus</i>) |
| Palmiste africain (<i>Gypohierax angolensis</i>) | Pluvier argenté (<i>Pluvialis squatarola</i>) | Souimanga à poitrine rouge (<i>Chalcomitra senegalensis</i>) |
| Pélican blanc (<i>Pelecanus onocrotalus</i>) | Pluvier de Forbes (<i>Charadrius forbesi</i>) | Souimanga à tête verte (<i>Cyanomitra verticalis</i>) |
| Pélican gris (<i>Pelecanus rufescens</i>) | Pluvier doré (<i>Pluvialis apricaria</i>) | Souimanga à ventre jaune (<i>Cimnyris venustus</i>) |
| Percnoptère d'Égypte (<i>Neophron percnopterus</i>) | Pluvier grand-gravelot (<i>Charadrius hiaticula</i>) | Souimanga à ventre olive (<i>Cimnyris chloropygius</i>) |
| Perroquet youyou (<i>Poicephalus senegalus</i>) | Pluvier pâtre (<i>Charadrius pecuarius</i>) | Souimanga brun (<i>Anthreptes gabonicus</i>) |
| Perruche à collier (<i>Psittacula krameri</i>) | Pluvier petit-gravelot (<i>Charadrius dubius</i>) | Souimanga cuivré (<i>Cimnyris cupreus</i>) |
| Petit Indicateur (<i>Indicator minor</i>) | Pouillot de Bonelli (<i>Phylloscopus bonelli</i>) | Souimanga éclatant (<i>Cimnyris coccinigastrus</i>) |
| Petit Moineau (<i>Gymnoris dentata</i>) | Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>) | Souimanga olivâtre (<i>Cyanomitra olivacea</i>) |
| Petit-duc à face blanche (<i>Ptilopsis leucotis</i>) | Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>) | Souimanga pygmée (<i>Hedydipna platura</i>) |
| Petit-duc africain (<i>Otus senegalensis</i>) | Poulette de roches (<i>Ptilopachus petrosus</i>) | Souimanga violet (<i>Anthreptes longuemarei</i>) |
| Phalarope à bec large (<i>Phalaropus fulicarius</i>) | Prinia à ailes rousses (<i>Prinia erythroptera</i>) | Spatule blanche (<i>Platalea leucorodia</i>) |
| Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) | Prinia modeste (<i>Prinia subflava</i>) | Spatule d'Afrique (<i>Platalea alba</i>) |
| Phyllanthe capucin (<i>Phyllanthus atripennis</i>) | Pritit à collier (<i>Platysteira cyanea</i>) | Sterne caspienne (<i>Hydroprogne caspia</i>) |
| Piapiac africain (<i>Ptilostomus afer</i>) | Pritit du Sénégal (<i>Batis senegalensis</i>) | Sterne caugek (<i>Thalasseus sandvicensis</i>) |
| Pic à dos brun (<i>Dendropicos obsoletus</i>) | Pygargue vocifer (<i>Haliaeetus vocifer</i>) | Sterne hansel (<i>Gelochelidon nilotica</i>) |
| Pic à taches noires (<i>Campethera punctuligera</i>) | Râle des prés (<i>Crex egregia</i>) | Sterne naine (<i>Sternula albifrons</i>) |
| Pic barré (<i>Campethera maculosa</i>) | Râle perlé (<i>Sarothrura pulchra</i>) | Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>) |
| Pic cardinal (<i>Dendropicos fuscescens</i>) | Rémiz à ventre jaune (<i>Anthoscopus parvulus</i>) | Sterne royale (<i>Thalasseus maximus</i>) |
| Pic goertan (<i>Dendropicos goertae</i>) | Rhynchée peinte (<i>Rostratula benghalensis</i>) | Sterne voyageuse (<i>Thalasseus bengalensis</i>) |
| Pic gris (<i>Dendropicos elachus</i>) | Rolle violet (<i>Eurystomus glaucurus</i>) | Talève d'Allen (<i>Porphyrio alleni</i>) |
| Pic tacheté (<i>Campethera nivosa</i>) | Rollier à ventre bleu (<i>Coracias cyanogaster</i>) | Talève sultane (<i>Porphyrio porphyrio</i>) |

Atlas ornithologique de la Casamance

| | |
|---|---|
| Tantale ibis (<i>Mycteria ibis</i>) | Vanneau à tête blanche (<i>Vanellus albiceps</i>) |
| Tarier des prés (<i>Saxicola rubetra</i>) | Vanneau à tête noire (<i>Vanellus tectus</i>) |
| Tchagra à tête noire (<i>Tchagra senegalus</i>) | Vanneau du Sénégal (<i>Vanellus senegallus</i>) |
| Tchitrec à ventre roux (<i>Terpsiphone rufiventer</i>) | Vanneau terne (<i>Vanellus lugubris</i>) |
| Tchitrec d'Afrique (<i>Terpsiphone viridis</i>) | Vautour à tête blanche (<i>Trionoceph occipitalis</i>) |
| Tisserin à tête noire (<i>Ploceus melanocephalus</i>) | Vautour africain (<i>Gyps africanus</i>) |
| Tisserin gendarme (<i>Ploceus cucullatus</i>) | Vautour charognard (<i>Necrosyrtes monachus</i>) |
| Tisserin masqué (<i>Ploceus heuglini</i>) | Vautour de Rüppell (<i>Gyps rueppelli</i>) |
| Tisserin minule (<i>Ploceus luteolus</i>) | Vautour fauve (<i>Gyps fulvus</i>) |
| Tisserin pirate (<i>Ploceus brachypterus</i>) | Vautour oricou (<i>Torgos tracheliotos</i>) |
| Tisserin vitellin (<i>Ploceus vitellinus</i>) | Veuve dominicaine (<i>Vidua macroura</i>) |
| Torcol fourmilier (<i>Jynx torquilla</i>) | Veuve nigériane (<i>Vidua interjecta</i>) |
| Touraco gris (<i>Crinifer piscator</i>) | Zostérops jaune (<i>Zosterops senegalensis</i>) |
| Touraco vert (<i>Tauraco persa</i>) | Edicnème du Sénégal (<i>Burhinus senegalensis</i>) |
| Touraco violet (<i>Musophaga violacea</i>) | Edicnème tachard (<i>Burhinus capensis</i>) |
| Tournepieuvre à collier (<i>Arenaria interpres</i>) | |
| Tourtelette améthystine (<i>Turtur afer</i>) | |
| Tourtelette d'Abyssinie (<i>Turtur abyssinicus</i>) | |
| Tourtelette masquée (<i>Oena capensis</i>) | |
| Tourterelle à collier (<i>Streptopelia semitorquata</i>) | |
| Tourterelle d'Adamaoua (<i>Streptopelia hypopyrrha</i>) | |
| Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>) | |
| Tourterelle maillée (<i>Spilopelia senegalensis</i>) | |
| Tourterelle pleureuse (<i>Streptopelia decipiens</i>) | |
| Tourterelle rieuse (<i>Streptopelia roseogrisea</i>) | |
| Tourterelle vineuse (<i>Streptopelia vinacea</i>) | |
| Traquet à front blanc (<i>Oenanthe albifrons</i>) | |
| Traquet de Heuglin (<i>Oenanthe heuglinii</i>) | |
| Traquet familial (<i>Cercomela familiaris</i>) | |
| Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>) | |
| Travailleur à bec rouge (<i>Quelea quelea</i>) | |
| Travailleur à tête rouge (<i>Quelea erythrops</i>) | |
| Turnix d'Andalousie (<i>Turnix sylvaticus</i>) | |
| Vanneau à éperons (<i>Vanellus spinosus</i>) | |