

Atlas ornithologique de la Casamance

Agrobate podobé (<i>Cercotrichas podobe</i>)	Autour unibande (<i>Kaupifalco monogrammicus</i>)	Bulbul à gorge claire (<i>Atimastillas flavicollis</i>)
Aigle botté (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	Avocette élégante (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	Bulbul à queue rousse (<i>Pyrrhurus scandens</i>)
Aigle couronné (<i>Stephanoaetus coronatus</i>)	Bagadais casqué (<i>Prionops plumatus</i>)	Bulbul des jardins (<i>Pycnonotus barbatus</i>)
Aigle d'Ayres (<i>Hieraaetus ayres</i>)	Balbuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)	Bulbul des raphias (<i>Thescelocichla leucopleura</i>)
Aigle de Wahlberg (<i>Hieraaetus wahlbergi</i>)	Barbican à poitrine rouge (<i>Pogonornis dubius</i>)	Bulbul fourmilier (<i>Bleda canicapillus</i>)
Aigle fascié (<i>Aquila spilogaster</i>)	Barbican de Vieillot (<i>Lybius vieilloti</i>)	Bulbul verdâtre (<i>Eurillas virens</i>)
Aigle huppard (<i>Lophaetus occipitalis</i>)	Barbion à croupion jaune (<i>Pogoniulus bilineatus</i>)	Busard cendré (<i>Circus pygargus</i>)
Aigle martial (<i>Polemaetus bellicosus</i>)	Barbion à front jaune (<i>Pogoniulus chrysoconus</i>)	Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)
Aigle ravisseur (<i>Aquila rapax</i>)	Barge à queue noire (<i>Limosa limosa</i>)	Busard pâle (<i>Circus macrourus</i>)
Aigrette à gorge blanche (<i>Egretta gularis</i>)	Barge rousse (<i>Limosa lapponica</i>)	Busautour des sauterelles (<i>Butastur rufipennis</i>)
Aigrette ardoisée (<i>Egretta ardesiaca</i>)	Bateleur des savanes (<i>Terathopius ecaudatus</i>)	Buse d'Afrique (<i>Buteo auguralis</i>)
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Baza coucou (<i>Aviceda cuculoides</i>)	Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)
Akalat à ailes rousses (<i>Illadopsis rufescens</i>)	Beaumarquet aurore (<i>Pytilia phoenicoptera</i>)	Caille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)
Akalat brun (<i>Illadopsis fulvescens</i>)	Bécasseau cocorli (<i>Calidris ferruginea</i>)	Calao à bec noir (<i>Lophoceros nasutus</i>)
Akalat de Puvel (<i>Illadopsis puveli</i>)	Bécasseau maubèche (<i>Calidris canutus</i>)	Calao à bec rouge (<i>Tockus erythrorhynchus</i>)
Alcin des chauves-souris (<i>Macheiramphus alcinus</i>)	Bécasseau minute (<i>Calidris minuta</i>)	Calao bréviabande (<i>Lophoceros semifasciatus</i>)
Alecto à bec blanc (<i>Bubalornis albirostris</i>)	Bécasseau sanderling (<i>Calidris alba</i>)	Calao siffleur (<i>Bycanistes fistulator</i>)
Amadine cou-coupé (<i>Amadina fasciata</i>)	Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>)	Camaroptère à tête grise (<i>Camaroptera brachyura</i>)
Amarante du Sénégal (<i>Lagonosticta senegala</i>)	Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>)	Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>)
Amarante foncé (<i>Lagonosticta rubricata</i>)	Bécassine sourde (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	Canard souchet (<i>Spatula clypeata</i>)
Amarante pointé (<i>Lagonosticta rufopicta</i>)	Becbleu sanguin (<i>Spermophaga haematina</i>)	Capucin bec-d'argent (<i>Euodice cantans</i>)
Amarante vineux (<i>Lagonosticta vinacea</i>)	Bengali zébré (<i>Amandava subflava</i>)	Capucin nonnette (<i>Spermestes cucullata</i>)
Anaplecte à ailes rouges (<i>Anaplectes leuconotos</i>)	Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)
Anhinga d'Afrique (<i>Anhinga melanogaster</i>)	Bergeronnette pie (<i>Motacilla aguimp</i>)	Chevalier arlequin (<i>Tringa erythropus</i>)
Anhinga d'Afrique (<i>Anhinga rufa</i>)	Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	Chevalier cul-blanc (<i>Tringa ochropus</i>)
Anserelle naine (<i>Nettapus auritus</i>)	Bihoreau gris (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>)
Apalis à gorge jaune (<i>Apalis flavida</i>)	Blongios de Sturm (<i>Ixobrychus sturmii</i>)	Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>)
Astrild à joues orange (<i>Estrilda melpoda</i>)	Blongios nain (<i>Ixobrychus minutus</i>)	Chevalier stagnatile (<i>Tringa stagnatilis</i>)
Astrild cendré (<i>Estrilda troglodytes</i>)	Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)	Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)
Astrild queue-de-vinaigre (<i>Estrilda caerulescens</i>)	Bruant à ventre jaune (<i>Emberiza affinis</i>)	Chevêchette perlée (<i>Glaucidium perlatum</i>)
Astrild-caille à lunettes (<i>Ortygospiza atricollis</i>)	Bruant de Gosling (<i>Emberiza goslingi</i>)	Choucador à longue queue (<i>Lamprotornis caudatus</i>)
Autour de Toussenel (<i>Accipiter toussenelii</i>)	Brubru africain (<i>Nilaus afer</i>)	Choucador à oreillons bleus (<i>Lamprotornis chalybaeus</i>)
Autour gabar (<i>Micronisus gabar</i>)	Bucorve d'Abyssinie (<i>Bucorvus abyssinicus</i>)	Choucador à queue violette (<i>Lamprotornis chalcurus</i>)
Autour sombre (<i>Melierax metabates</i>)	Bulbul à gorge blanche (<i>Phyllastrephus albigularis</i>)	Choucador de Swainson (<i>Lamprotornis chloropterus</i>)

Atlas ornithologique de la Casamance

Choucador pourpré (<i>Lamprolornis purpureus</i>)	Coucou didric (<i>Chrysococcyx caprius</i>)	Euplecte franciscain (<i>Euplectes franciscanus</i>)
Choucador splendide (<i>Lamprolornis splendidus</i>)	Coucou foliotocol (<i>Chrysococcyx cupreus</i>)	Euplecte monseigneur (<i>Euplectes hordeaceus</i>)
Cigogne à pattes noires (<i>Ciconia microscelis</i>)	Coucou geai (<i>Clamator glandarius</i>)	Euplecte vorabé (<i>Euplectes afer</i>)
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)	Faucon à cou roux (<i>Falco ruficollis</i>)
Cigogne noire (<i>Ciconia nigra</i>)	Coucou solitaire (<i>Cuculus solitarius</i>)	Faucon ardoisé (<i>Falco ardosiaceus</i>)
Circaète brun (<i>Circaetus cinereus</i>)	Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>)	Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)
Circaète cendré (<i>Circaetus cinerascens</i>)	Courlis corlieu (<i>Numenius phaeopus</i>)	Faucon crécerellette (<i>Falco naumanni</i>)
Circaète de Beaudouin (<i>Circaetus beaudouini</i>)	Courvite à ailes bronzées (<i>Rhinoptilus chalconotus</i>)	Faucon de Cuvier (<i>Falco cuvierii</i>)
Circaète Jean-le-Blanc (<i>Circaetus gallicus</i>)	Courvite de Temminck (<i>Cursorius temminckii</i>)	Faucon lanier (<i>Falco biarmicus</i>)
Cisticole à ailes courtes (<i>Cisticola brachypterus</i>)	Crabier chevelu (<i>Ardeola ralloides</i>)	Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)
Cisticole à dos noir (<i>Cisticola eximius</i>)	Cratérope à tête noire (<i>Turdoides reinwardtii</i>)	Faucon sacré (<i>Falco cherrug</i>)
Cisticole chanteuse (<i>Cisticola cantans</i>)	Cratérope brun (<i>Turdoides plebejus</i>)	Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)
Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Crombec sittelle (<i>Sylvietta brachyura</i>)	Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)
Cisticole rousse (<i>Cisticola rufus</i>)	Crombec vert (<i>Sylvietta virens</i>)	Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)
Cisticole siffleuse (<i>Cisticola lateralis</i>)	Cubla de Gambie (<i>Dryoscopus gambensis</i>)	Fauvette passerinette (<i>Sylvia cantillans</i>)
Cochevis huppé (<i>Galerida cristata</i>)	Dendrocyste veuf (<i>Dendrocyste viduata</i>)	Flamant nain (<i>Phoeniconaias minor</i>)
Colombar à front nu (<i>Treron calvus</i>)	Drongo brillant (<i>Dicrurus adsimilis</i>)	Flamant rose (<i>Phoenicopterus roseus</i>)
Colombar waalia (<i>Treron waalia</i>)	Drongo de Ludwig (<i>Dicrurus ludwigii</i>)	Fou brun (<i>Sula leucogaster</i>)
Combassou de Wilson (<i>Vidua wilsoni</i>)	Échasse blanche (<i>Himantopus himantopus</i>)	Francolin à double éperon (<i>Francolinus bicalcaratus</i>)
Combassou du Cameroun (<i>Vidua camerunensis</i>)	Échenilleur à épaulettes rouges (<i>Campephaga phoenicea</i>)	Francolin d'Ahanta (<i>Pternistis ahantensis</i>)
Combassou du Sénégal (<i>Vidua chalybeata</i>)	Échenilleur à ventre blanc (<i>Ceblepyris pectoralis</i>)	Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>)
Combattant varié (<i>Calidris pugnax</i>)	Effraie des clochers (<i>Tyto alba</i>)	Gallinule africaine (<i>Gallinula angulata</i>)
Corbeau pie (<i>Corvus albus</i>)	Élanion blanc (<i>Elanus caeruleus</i>)	Gallinule poule-d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>)
Cordonbleu à joues rouges (<i>Uraeginthus bengalus</i>)	Elminie bleue (<i>Elminia longicauda</i>)	Ganga quadribande (<i>Pterocles quadricinctus</i>)
Cormoran africain (<i>Microcarbo africanus</i>)	Engoulevent à balanciers (<i>Caprimulgus longipennis</i>)	Gladiateur de Blanchot (<i>Malaconotus blanchoti</i>)
Corvinelle à bec jaune (<i>Corvinella corvina</i>)	Engoulevent à longue queue (<i>Caprimulgus climacurus</i>)	Glaréole à collier (<i>Glareola pratincola</i>)
Cossyphé à calotte blanche (<i>Cossypha albicapillus</i>)	Engoulevent terne (<i>Caprimulgus inornatus</i>)	Gobemouche des marais (<i>Muscicapa aquatica</i>)
Cossyphé à calotte neigeuse (<i>Cossypha niveicapilla</i>)	Épervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	Gobemouche drongo (<i>Melaenornis edolioides</i>)
Coucal à ventre blanc (<i>Centropus leucogaster</i>)	Épervier de Hartlaub (<i>Accipiter erythropus</i>)	Gobemouche gris (<i>Muscicapa striata</i>)
Coucal du Sénégal (<i>Centropus senegalensis</i>)	Épervier des Ovampos (<i>Accipiter ovampensis</i>)	Gobemouche mésange (<i>Fraseria plumbea</i>)
Coucal noir (<i>Centropus grillii</i>)	Épervier shikra (<i>Accipiter badius</i>)	Gobemouche noir (<i>Ficedula hypoleuca</i>)
Coucou africain (<i>Cuculus gularis</i>)	Érémomèle à dos vert (<i>Eremomela pusilla</i>)	Gobemouche pâle (<i>Agricola pallidus</i>)
Coucou de Klaas (<i>Chrysococcyx klaas</i>)	Étourneau améthyste (<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>)	Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)
Coucou de Levassant (<i>Clamator levassantii</i>)	Euplecte à dos d'or (<i>Euplectes macroura</i>)	Goéland cendré (<i>Larus canus</i>)

Atlas ornithologique de la Casamance

Goéland d'Audouin (<i>Larus audouinii</i>)	Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)	Marouette poussin (<i>Zapornia parva</i>)
Goéland dominicain (<i>Larus dominicanus</i>)	Héron strié (<i>Butorides striata</i>)	Martin-chasseur à poitrine bleue (<i>Halcyon malimbica</i>)
Goéland leucopnée (<i>Larus michahellis</i>)	Hirondelle à ailes tachetées (<i>Hirundo leucosoma</i>)	Martin-chasseur à tête grise (<i>Halcyon leucocephala</i>)
Goéland railleur (<i>Larus genei</i>)	Hirondelle à longs brins (<i>Hirundo smithii</i>)	Martin-chasseur du Sénégal (<i>Halcyon senegalensis</i>)
Gonolek de Barbarie (<i>Laniarius barbarus</i>)	Hirondelle à ventre roux (<i>Cecropis semirufa</i>)	Martin-chasseur strié (<i>Halcyon chelicuti</i>)
Gonolek souffré (<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>)	Hirondelle de fenêtre (<i>Delichon urbicum</i>)	Martin-pêcheur azuré (<i>Alcedo quadibrachys</i>)
Gorgebleue à miroir (<i>Cyanecula svecica</i>)	Hirondelle de Guinée (<i>Hirundo lucida</i>)	Martin-pêcheur géant (<i>Megaceryle maxima</i>)
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>)	Martin-pêcheur huppé (<i>Corythornis cristatus</i>)
Grand Indicateur (<i>Indicator indicator</i>)	Hirondelle des mosquées (<i>Cecropis senegalensis</i>)	Martin-pêcheur pie (<i>Ceryle rudis</i>)
Grand Labbe (<i>Catharacta skua</i>)	Hirondelle fanti (<i>Psaldiprocne obscura</i>)	Martin-pêcheur pygmée (<i>Ispidina picta</i>)
Grand-duc de Verreaux (<i>Bubo lacteus</i>)	Hirondelle rousseline (<i>Cecropis daurica</i>)	Martinet cafre (<i>Apus caffer</i>)
Grand-duc du Sahel (<i>Bubo cinerascens</i>)	Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	Martinet d'Ussher (<i>Telacanthura ussheri</i>)
Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>)	Huîtrier pie (<i>Haematopus ostralegus</i>)	Martinet des maisons (<i>Apus affinis</i>)
Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)	Martinet des palmes (<i>Cypsiurus parvus</i>)
Grébifoulque d'Afrique (<i>Podica senegalensis</i>)	Hylia verte (<i>Hylia prasina</i>)	Martinet noir (<i>Apus apus</i>)
Grue couronnée (<i>Balearica pavonina</i>)	Hyliote à ventre jaune (<i>Hylia flavigaster</i>)	Martinet pâle (<i>Apus pallidus</i>)
Guêpier à gorge blanche (<i>Merops albicollis</i>)	Hypolaïs ictérine (<i>Hippolais icterina</i>)	Mélocichle à moustaches (<i>Melocichla mentalis</i>)
Guêpier à gorge rouge (<i>Merops bulocki</i>)	Hypolaïs obscure (<i>Iduna opaca</i>)	Merle africain (<i>Turdus pelios</i>)
Guêpier à queue d'aronde (<i>Merops hirundineus</i>)	Hypolaïs polyglotte (<i>Hippolais polyglotta</i>)	Mésange galonnée (<i>Melaniparus guineensis</i>)
Guêpier d'Europe (<i>Merops apiaster</i>)	Ibis hagedash (<i>Bostrychia hagedash</i>)	Milan à bec jaune (<i>Milvus migrans parasitus</i>)
Guêpier de Perse (<i>Merops persicus</i>)	Ibis sacré (<i>Threskiornis aethiopicus</i>)	Milan à bec jaune (<i>Milvus parasitus</i>)
Guêpier écarlate (<i>Merops nubicus</i>)	Indicateur tacheté (<i>Indicator maculatus</i>)	Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)
Guêpier nain (<i>Merops pusillus</i>)	Irrisor moqueur (<i>Phoeniculus purpureus</i>)	Moineau gris (<i>Passer griseus</i>)
Guêpier vert (<i>Merops viridissimus</i>)	Irrisor noir (<i>Rhinopomastus aterrimus</i>)	Moinelette à oreillons blancs (<i>Eremopterix leucotis</i>)
Guifette leucoptère (<i>Chlidonias leucopterus</i>)	Jabiru d'Afrique (<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>)	Mouette à tête grise (<i>Larus cirrocephalus</i>)
Guifette moustac (<i>Chlidonias hybrida</i>)	Jacana à poitrine dorée (<i>Actophilornis africanus</i>)	Mouette rieuse (<i>Larus ridibundus</i>)
Guifette noire (<i>Chlidonias niger</i>)	Labbe pomarin (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	Nicator du Sénégal (<i>Nicator chloris</i>)
Gymnogène d'Afrique (<i>Polyboroides typus</i>)	Locustelle tachetée (<i>Locustella naevia</i>)	Nigrette à ventre roux (<i>Nigrita bicolor</i>)
Héron à bec jaune (<i>Ardea brachyrhyncha</i>)	Loriot doré (<i>Oriolus auratus</i>)	Noircap loriot (<i>Hypergerus atriceps</i>)
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	Mahali à calotte marron (<i>Plocepasser superciliosus</i>)	Océanite tempête (<i>Hydrobates pelagicus</i>)
Héron garde-boeufs (<i>Bubulcus ibis</i>)	Malcoha à bec jaune (<i>Ceuthmochares aereus</i>)	Oedicnème du Sénégal (<i>Burhinus senegalensis</i>)
Héron garde-boeufs (<i>Bubulcus ibis</i>)	Marabout d'Afrique (<i>Leptoptilos crumeniferus</i>)	Oedicnème tachard (<i>Burhinus capensis</i>)
Héron goliath (<i>Ardea goliath</i>)	Marouette à bec jaune (<i>Zapornia flavirostra</i>)	Oie-armée de Gambie (<i>Plectropterus gambensis</i>)
Héron mélanocéphale (<i>Ardea melanocephala</i>)	Marouette de Baillon (<i>Porzana pusilla</i>)	Ombrette africaine (<i>Scopus umbretta</i>)

Atlas ornithologique de la Casamance

Ouette d'Égypte (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	Pluvier argenté (<i>Pluvialis squatarola</i>)	Souimanga à ventre olive (<i>Cinnyris chloropygius</i>)
Outarde à ventre noir (<i>Lissotis melanogaster</i>)	Pluvier de Forbes (<i>Charadrius forbesi</i>)	Souimanga brun (<i>Anthreptes gabonicus</i>)
Outarde du Sénégal (<i>Eupodotis senegalensis</i>)	Pluvier grand-gravelot (<i>Charadrius hiaticula</i>)	Souimanga cuivré (<i>Cinnyris cupreus</i>)
Palmiste africain (<i>Gypohierax angolensis</i>)	Pluvier pâte (<i>Charadrius pecuarius</i>)	Souimanga éclatant (<i>Cinnyris coccinigastrus</i>)
Pélican blanc (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	Pluvier petit-gravelot (<i>Charadrius dubius</i>)	Souimanga olivâtre (<i>Cyanomitra olivacea</i>)
Pélican gris (<i>Pelecanus rufescens</i>)	Pouillot de Bonelli (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	Souimanga pygmée (<i>Hedydipna platura</i>)
Percnoptère d'Égypte (<i>Neophron percnopterus</i>)	Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	Souimanga violet (<i>Anthreptes longuemarei</i>)
Perroquet youyou (<i>Poicephalus senegalus</i>)	Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Spatule blanche (<i>Platalea leucorodia</i>)
Perruche à collier (<i>Psittacula krameri</i>)	Poulette de roches (<i>Ptilopachus petrosus</i>)	Spatule d'Afrique (<i>Platalea alba</i>)
Petit Indicateur (<i>Indicator minor</i>)	Prinia à ailes rousses (<i>Prinia erythroptera</i>)	Sterne caspienne (<i>Hydroprogne caspia</i>)
Petit Moineau (<i>Gymnoris dentata</i>)	Prinia modeste (<i>Prinia subflava</i>)	Sterne caugé (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)
Petit-duc à face blanche (<i>Ptilopsis leucotis</i>)	Pririt à collier (<i>Platysteira cyanea</i>)	Sterne hansel (<i>Gelochelidon nilotica</i>)
Petit-duc africain (<i>Otus senegalensis</i>)	Pririt du Sénégal (<i>Batis senegalensis</i>)	Sterne naine (<i>Sternula albifrons</i>)
Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	Pygargue vocifer (<i>Haliaeetus vocifer</i>)	Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)
Phyllanthe capucin (<i>Phyllanthus atripennis</i>)	Râle perlé (<i>Sarothrura pulchra</i>)	Sterne royale (<i>Thalasseus maximus</i>)
Piapiac africain (<i>Ptilostomus afer</i>)	Rémiz à ventre jaune (<i>Anthoscopus parvulus</i>)	Sterne voyageuse (<i>Thalasseus bengalensis</i>)
Pic à dos brun (<i>Dendropicos obsoletus</i>)	Rhynchée peinte (<i>Rostratula benghalensis</i>)	Talève d'Allen (<i>Porphyrio alleni</i>)
Pic à taches noires (<i>Campethera punctuligera</i>)	Rolle violet (<i>Eurystomus glaucurus</i>)	Talève sultane (<i>Porphyrio porphyrio</i>)
Pic barré (<i>Campethera maculosa</i>)	Rollier à ventre bleu (<i>Coracias cyanogaster</i>)	Tantale ibis (<i>Mycteria ibis</i>)
Pic cardinal (<i>Dendropicos fuscescens</i>)	Rollier d'Abyssinie (<i>Coracias abyssinicus</i>)	Tarier des prés (<i>Saxicola rubetra</i>)
Pic goertan (<i>Dendropicos goertae</i>)	Rollier varié (<i>Coracias naevius</i>)	Tchagra à tête noire (<i>Tchagra senegalus</i>)
Pic gris (<i>Dendropicos elachus</i>)	Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	Tchitrec à ventre roux (<i>Terpsiphone rufiventer</i>)
Pic tacheté (<i>Campethera nivosa</i>)	Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	Tchitrec d'Afrique (<i>Terpsiphone viridis</i>)
Pie-grièche à tête rousse (<i>Lanius senator</i>)	Rousserolle africaine (<i>Acrocephalus scirpaceus baeticatus</i>)	Tisserin à tête noire (<i>Ploceus melanocephalus</i>)
Pigeon roussard (<i>Columba guinea</i>)	Rousserolle effarvatte (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	Tisserin gendarme (<i>Ploceus cucullatus</i>)
Pintade de Numidie (<i>Numida meleagris</i>)	Sarcidiorne à bosse (<i>Sarkidiornis melanotos</i>)	Tisserin masqué (<i>Ploceus heuglini</i>)
Pipit à dos uni (<i>Anthus leucophrys</i>)	Sentinelle à gorge jaune (<i>Macronyx croceus</i>)	Tisserin minule (<i>Ploceus luteolus</i>)
Pipit à gorge rousse (<i>Anthus cervinus</i>)	Serin à croupion blanc (<i>Crithagra leucopygia</i>)	Tisserin pirate (<i>Ploceus brachypterus</i>)
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	Serin du Mozambique (<i>Crithagra mozambica</i>)	Tisserin pirate (<i>Ploceus nigricollis</i>)
Pipit rousseline (<i>Anthus campestris</i>)	Souimanga à collier (<i>Hedydipna collaris</i>)	Tisserin vitellin (<i>Ploceus vitellinus</i>)
Piqueboeuf à bec jaune (<i>Buphagus africanus</i>)	Souimanga à longue queue (<i>Cinnyris pulchellus</i>)	Torcol fourmilier (<i>Jynx torquilla</i>)
Piquebœuf à bec jaune (<i>Buphagus africanus</i>)	Souimanga à poitrine rouge (<i>Chalcomitra senegalensis</i>)	Touraco gris (<i>Crinifer piscator</i>)
Pluvian fluviatile (<i>Pluvianus aegyptius</i>)	Souimanga à tête verte (<i>Cyanomitra verticalis</i>)	Touraco vert (<i>Tauraco persa</i>)
Pluvier à collier interrompu (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	Souimanga à ventre jaune (<i>Cinnyris venustus</i>)	Touraco violet (<i>Musophaga violacea</i>)

Atlas ornithologique de la Casamance

Tournepierre à collier
(*Arenaria interpres*)
Tourtelette améthystine
(*Turtur afer*)
Tourtelette d'Abyssinie
(*Turtur abyssinicus*)
Tourtelette masquée
(*Oena capensis*)
Tourterelle à collier
(*Streptopelia semitorquata*)
Tourterelle d'Adamaoua
(*Streptopelia hypopyrrha*)
Tourterelle des bois
(*Streptopelia turtur*)
Tourterelle maillée
(*Spilopelia senegalensis*)
Tourterelle pleureuse
(*Streptopelia decipiens*)
Tourterelle rieuse
(*Streptopelia roseogrisea*)
Tourterelle vineuse
(*Streptopelia vinacea*)
Traquet à front blanc
(*Oenanthe albifrons*)
Traquet de Heuglin
(*Oenanthe heuglinii*)
Traquet familial
(*Oenanthe familiaris*)
Traquet motteux
(*Oenanthe oenanthe*)
Travailleur à bec rouge
(*Quelea quelea*)
Travailleur à tête rouge
(*Quelea erythrops*)
Turnix d'Andalousie
(*Turnix sylvaticus*)
Vanneau à éperons
(*Vanellus spinosus*)
Vanneau à tête blanche
(*Vanellus albiceps*)
Vanneau à tête noire
(*Vanellus tectus*)
Vanneau du Sénégal
(*Vanellus senegallus*)
Vautour à tête blanche
(*Trionoceph occipitalis*)
Vautour africain
(*Gyps africanus*)
Vautour charognard
(*Necrosyrtes monachus*)
Vautour de Rüppell
(*Gyps rueppellii*)
Vautour fauve
(*Gyps fulvus*)
Vautour oricou
(*Torgos tracheliotos*)
Veuve dominicaine
(*Vidua macroura*)
Veuve nigériane
(*Vidua interjecta*)
Zostérops jaune
(*Zosterops senegalensis*)
Œdicnème du Sénégal
(*Burhinus senegalensis*)
Œdicnème tachard
(*Burhinus capensis*)