

Atlas ornithologique de la Casamance

Agrobate podobé (<i>Cercotrichas podobe</i>)	Astrild-caille à lunettes (<i>Ortygospiza atricollis</i>)	Blongios de Sturm (<i>Ixobrychus sturmii</i>)
Agrobate roux (<i>Cercotrichas galactotes</i>)	Autour de Toussenel (<i>Accipiter toussenelii</i>)	Blongios nain (<i>Ixobrychus minutus</i>)
Aigle botté (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	Autour gabar (<i>Micronisus gabar</i>)	Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)
Aigle couronné (<i>Stephanoaetus coronatus</i>)	Autour noir (<i>Accipiter melanoleucus</i>)	Bruant à ventre jaune (<i>Emberiza affinis</i>)
Aigle d'Ayres (<i>Ayres's Hawk-Eagle</i>)	Autour sombre (<i>Melierax metabates</i>)	Bruant d'Alexander (<i>Emberiza goslingi</i>)
Aigle de Wahlberg (<i>Hieraaetus wahlbergi</i>)	Autour unibande (<i>Kaupifalco monogrammicus</i>)	Brubru africain (<i>Nilaus afer</i>)
Aigle fascié (<i>Aquila spilogaster</i>)	Avocette élégante (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	Bucorve d'Abyssinie (<i>Bucorvus abyssinicus</i>)
Aigle huppard (<i>Lophaetus occipitalis</i>)	Bagadais casqué (<i>Prionops plumatus</i>)	Bulbul à bec grêle (<i>Stelgidillas gracilirostris</i>)
Aigle martial (<i>Polemaetus bellicosus</i>)	Balbuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)	Bulbul à gorge blanche (<i>Phyllastrephus albigularis</i>)
Aigle ravisser (<i>Aquila rapax</i>)	Barbican à poitrine rouge (<i>Lybius dubius</i>)	Bulbul à gorge claire (<i>Atimastillas flavicollis</i>)
Aigrette à gorge blanche (<i>Egretta gularis</i>)	Barbican de Vieillot (<i>Lybius vieilloti</i>)	Bulbul à moustaches jaunes (<i>Andropadus latirostris</i>)
Aigrette ardoisée (<i>Egretta ardesiaca</i>)	Barbion à croupion jaune (<i>Pogoniulus bilineatus</i>)	Bulbul à queue rousse (<i>Phyllastrephus scandens</i>)
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Barbion à front jaune (<i>Pogoniulus chrysoconus</i>)	Bulbul des jardins (<i>Pycnonotus barbatus</i>)
Akalat à ailes rousses (<i>Illadopsis rufescens</i>)	Barge à queue noire (<i>Limosa limosa</i>)	Bulbul des raphias (<i>Thescelocichla leucopleura</i>)
Akalat brun (<i>Illadopsis fulvescens</i>)	Barge rousse (<i>Limosa lapponica</i>)	Bulbul fourmilier (<i>Bleda canicapillus</i>)
Akalat de Puvel (<i>Illadopsis puveli</i>)	Bateleur des savanes (<i>Terathopius ecaudatus</i>)	Bulbul verdâtre (<i>Eurillas virens</i>)
Alcin des chauves-souris (<i>Macheiramphus alcinus</i>)	Baza coucou (<i>Aviceda cuculoides</i>)	Busard cendré (<i>Circus pygargus</i>)
Alecto à bec blanc (<i>Bubalornis albirostris</i>)	Beaumarquet aurore (<i>Pytilia phoenicoptera</i>)	Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)
Alèthe à huppe rousse (<i>Alethe diademata</i>)	Beaumarquet melba (<i>Pytilia melba</i>)	Busard pâle (<i>Circus macrourus</i>)
Alouette bourdonnante (<i>Mirafra rufocinnamomea</i>)	Bec-en-ciseaux d'Afrique (<i>Rynchops flavirostris</i>)	Busautour des sauterelles (<i>Butastur rufipennis</i>)
Alouette de Java (<i>Horsfield's Bushlark</i>)	Bécasseau cocorli (<i>Calidris ferruginea</i>)	Buse d'Afrique (<i>Buteo auguralis</i>)
Amadine cou-coupé (<i>Amadina fasciata</i>)	Bécasseau maubèche (<i>Calidris canutus</i>)	Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)
Amarante du Sénégal (<i>Lagonosticta senegala</i>)	Bécasseau minute (<i>Calidris minuta</i>)	Butor étoilé (<i>Botaurus stellaris</i>)
Amarante foncé (<i>Lagonosticta rubricata</i>)	Bécasseau sanderling (<i>Calidris alba</i>)	Caille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)
Amarante pointé (<i>Lagonosticta rufopicta</i>)	Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>)	Calao à bec noir (<i>Lophoceros nasutus</i>)
Amarante vineux (<i>Lagonosticta vinacea</i>)	Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>)	Calao bréviabande (<i>Lophoceros semifasciatus</i>)
Anaplecte écarlate (<i>Anaplectes rubriceps</i>)	Bécassine sourde (<i>Lymnocyrtus minimus</i>)	Calao occidental (<i>Tockus kempfi</i>)
Anhinga d'Afrique (<i>Anhinga rufa</i>)	Becbleu sanguin (<i>Spermophaga haematina</i>)	Calao siffleur (<i>Bycanistes fistulator</i>)
Anomalospize parasite (<i>Anomalospiza imberbis</i>)	Bengali zébré (<i>Amandava subflava</i>)	Camaroptère à tête grise (<i>Camaroptera brachyura</i>)
Anserelle naine (<i>Nettapus auritus</i>)	Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	Canard souchet (<i>Spatula clypeata</i>)
Apalis à gorge jaune (<i>Apalis flavida</i>)	Bergeronnette pie (<i>Motacilla aguimp</i>)	Capucin bec-d'argent (<i>Euodice cantans</i>)
Astrild à joues orange (<i>Estrilda melpoda</i>)	Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	Capucin nonnette (<i>Lonchura cucullata</i>)
Astrild cendré (<i>Estrilda troglodytes</i>)	Bihoreau à dos blanc (<i>Gorsachius leuconotus</i>)	Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)
Astrild queue-de-vinaigre (<i>Estrilda caerulescens</i>)	Bihoreau gris (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	Chevalier arlequin (<i>Tringa erythropus</i>)

Atlas ornithologique de la Casamance

Chevalier cul-blanc (<i>Tringa ochropus</i>)	Colombar waalia (<i>Treron waalia</i>)	Dendrocygne veuf (<i>Dendrocygna viduata</i>)
Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>)	Combassou de Wilson (<i>Vidua wilsoni</i>)	Drongo de Lichtenstein (<i>Dicrurus divaricatus</i>)
Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>)	Combassou du Cameroun (<i>Vidua camerunensis</i>)	Drongo occidental (<i>Dicrurus occidentalis</i>)
Chevalier stagnatile (<i>Tringa stagnatilis</i>)	Combassou du Sénégal (<i>Vidua chalybeata</i>)	Échasse blanche (<i>Himantopus himantopus</i>)
Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)	Combattant varié (<i>Calidris pugnax</i>)	Échenilleur à épaulettes rouges (<i>Campephaga phoenicea</i>)
Chevêchette perlée (<i>Glaucidium perlatum</i>)	Corbeau pie (<i>Corvus albus</i>)	Échenilleur à ventre blanc (<i>Coracina pectoralis</i>)
Choucador à longue queue (<i>Lamprotornis caudatus</i>)	Cordonbleu à joues rouges (<i>Uraeginthus bengalus</i>)	Effraie des clochers (<i>Tyto alba</i>)
Choucador à oreillons bleus (<i>Lamprotornis chalybaeus</i>)	Cormoran à poitrine blanche (<i>Phalacrocorax lucidus</i>)	Élanion blanc (<i>Elanus caeruleus</i>)
Choucador à queue violette (<i>Lamprotornis chalcurus</i>)	Cormoran africain (<i>Microcarbo africanus</i>)	Elminie bleue (<i>Elminia longicauda</i>)
Choucador à ventre roux (<i>Lamprotornis pulcher</i>)	Corvinelle à bec jaune (<i>Corvinella corvina</i>)	Engoulevent à balanciers (<i>Caprimulgus longipennis</i>)
Choucador de Swainson (<i>Lamprotornis chloropterus</i>)	Cossyphè à calotte blanche (<i>Cossypha albicapillus</i>)	Engoulevent à épaulettes noires (<i>Caprimulgus nigriscapularis</i>)
Choucador pourpré (<i>Lamprotornis purpureus</i>)	Cossyphè à calotte neigeuse (<i>Cossypha niveicapilla</i>)	Engoulevent à longue queue (<i>Caprimulgus climacurus</i>)
Choucador splendide (<i>Lamprotornis splendidus</i>)	Coucal à ventre blanc (<i>Centropus leucogaster</i>)	Engoulevent d'Europe (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Chouette africaine (<i>Strix woodfordii</i>)	Coucal du Sénégal (<i>Centropus senegalensis</i>)	Épervier de Hartlaub (<i>Accipiter erythropus</i>)
Chouette-pêcheuse de Pel (<i>Scotopelia peli</i>)	Coucal noir (<i>Centropus grillii</i>)	Épervier des Ovampos (<i>Accipiter ovampensis</i>)
Cigogne à pattes noires (<i>Ciconia microscelis</i>)	Coucou africain (<i>Cuculus gularis</i>)	Épervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	Coucou de Klaas (<i>Chrysococcyx klaas</i>)	Épervier shikra (<i>Accipiter badius</i>)
Cigogne noire (<i>Ciconia nigra</i>)	Coucou de Levailant (<i>Clamator levaillantii</i>)	Érémomèle à dos vert (<i>Eremomela pusilla</i>)
Circaète brun (<i>Circaetus cinereus</i>)	Coucou didric (<i>Chrysococcyx caprius</i>)	Étourneau améthyste (<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>)
Circaète cendré (<i>Circaetus cinerascens</i>)	Coucou foliotocol (<i>Chrysococcyx cupreus</i>)	Euplecte à dos d'or (<i>Euplectes macroura</i>)
Circaète de Beaudouin (<i>Circaetus beaudouini</i>)	Coucou geai (<i>Clamator glandarius</i>)	Euplecte franciscain (<i>Euplectes franciscanus</i>)
Circaète Jean-le-Blanc (<i>Circaetus gallicus</i>)	Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)	Euplecte monseigneur (<i>Euplectes hordeaceus</i>)
Cisticole à ailes courtes (<i>Cisticola brachypterus</i>)	Coucou solitaire (<i>Cuculus solitarius</i>)	Euplecte vorabé (<i>Euplectes afer</i>)
Cisticole à dos noir (<i>Cisticola eximius</i>)	Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>)	Faucon à cou roux (<i>Falco ruficollis</i>)
Cisticole à face rousse (<i>Cisticola erythropus</i>)	Courlis corlieu (<i>Numenius phaeopus</i>)	Faucon ardoisé (<i>Falco ardosiaceus</i>)
Cisticole chanteuse (<i>Cisticola cantans</i>)	Courvite à ailes bronzées (<i>Rhinoptilus chalcopterus</i>)	Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)
Cisticole de Dorst (<i>Cisticola guinea</i>)	Courvite de Temminck (<i>Cursorius temminckii</i>)	Faucon crécerellette (<i>Falco naumanni</i>)
Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Crabier chevelu (<i>Ardeola ralloides</i>)	Faucon de Cuvier (<i>Falco cuvierii</i>)
Cisticole du Nil (<i>Cisticola marginatus</i>)	Cratérope à tête noire (<i>Turdoides reinwardtii</i>)	Faucon lanier (<i>Falco biarmicus</i>)
Cisticole rousse (<i>Cisticola rufus</i>)	Cratérope brun (<i>Turdoides plebejus</i>)	Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)
Cisticole siffleuse (<i>Cisticola lateralis</i>)	Crécerelle renard (<i>Falco alopex</i>)	Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)
Cochevis huppé (<i>Galerida cristata</i>)	Crombec sittelle (<i>Sylvietta brachyura</i>)	Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)
Cochevis modeste (<i>Galerida modesta</i>)	Crombec vert (<i>Sylvietta virens</i>)	Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)
Colombar à front nu (<i>Treron calvus</i>)	Cubla de Gambie (<i>Dryoscopus gambensis</i>)	Fauvette passerinette (<i>Sylvia inornata</i>)

Atlas ornithologique de la Casamance

Flamant nain (<i>Phoeniconaias minor</i>)	Grand-duc du Sahel (<i>Bubo cinerascens</i>)	Hirondelle paludicole (<i>Riparia paludicola</i>)
Flamant rose (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>)	Hirondelle rousseline (<i>Cecropis daurica</i>)
Fou brun (<i>Sula leucogaster</i>)	Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)
Fou de Bassan (<i>Morus bassanus</i>)	Grébifoulque d'Afrique (<i>Podica senegalensis</i>)	Hirondelle striée (<i>Cecropis abyssinica</i>)
Francolin à double éperon (<i>Pternistis bicalcaratus</i>)	Grue couronnée (<i>Balearica pavonina</i>)	Huîtrier pie (<i>Haematopus ostralegus</i>)
Francolin à gorge blanche (<i>Francolinus albogularis</i>)	Guêpier à gorge blanche (<i>Merops albicollis</i>)	Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)
Francolin d'Ahanta (<i>Pternistis achantensis</i>)	Guêpier à gorge rouge (<i>Merops bulocki</i>)	Hylia verte (<i>Hylia prasina</i>)
Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>)	Guêpier à queue d'aronde (<i>Merops hirundineus</i>)	Hyliote à ventre jaune (<i>Hylia flavigaster</i>)
Gallinule africaine (<i>Paragallinula angulata</i>)	Guêpier de Perse (<i>Merops persicus</i>)	Hypolaïs icterine (<i>Hippolaïs icterina</i>)
Gallinule poule-d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>)	Guêpier d'Europe (<i>Merops apiaster</i>)	Hypolaïs obscure (<i>Iduna opaca</i>)
Ganga à ventre brun (<i>Pterocles exustus</i>)	Guêpier écarlate (<i>Merops nubicus</i>)	Hypolaïs polyglotte (<i>Hippolaïs polyglotta</i>)
Ganga quadribande (<i>Pterocles quadricinctus</i>)	Guêpier nain (<i>Merops pusillus</i>)	Ibis falcinelle (<i>Plegadis falcinellus</i>)
Gladiateur de Blanchot (<i>Malaconotus blanchoti</i>)	Guêpier vert (<i>Merops orientalis</i>)	Ibis hagedash (<i>Bostrychia hagedash</i>)
Glaréole à collier (<i>Glareola pratincola</i>)	Guifette leucoptère (<i>Chlidonias leucopterus</i>)	Ibis sacré (<i>Threskiornis aethiopicus</i>)
Gobemouche à sourcils blancs (<i>Fraseria cinerascens</i>)	Guifette moustac (<i>Chlidonias hybrida</i>)	Indicateur de Wahlberg (<i>Prodotiscus regulus</i>)
Gobemouche des marais (<i>Muscicapa aquatica</i>)	Guifette noire (<i>Chlidonias niger</i>)	Indicateur tacheté (<i>Indicator maculatus</i>)
Gobemouche drongo (<i>Melaenornis edoloides</i>)	Gymnogène d'Afrique (<i>Polyboroides typus</i>)	Irrisor moqueur (<i>Phoeniculus purpureus</i>)
Gobemouche gris (<i>Muscicapa striata</i>)	Héron à bec jaune (<i>Ardea intermedia</i>)	Irrisor noir (<i>Rhinopomastus aterrimus</i>)
Gobemouche mésange (<i>Myioparus plumbeus</i>)	Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	Jabiru d'Afrique (<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>)
Gobemouche noir (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Héron garde-bœufs (<i>Bubulcus ibis</i>)	Jacana à poitrine dorée (<i>Actophilornis africanus</i>)
Gobemouche pâle (<i>Melaenornis pallidus</i>)	Héron goliath (<i>Ardea goliath</i>)	Jacana nain (<i>Microparra capensis</i>)
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)	Héron mélanocéphale (<i>Ardea melanocephala</i>)	Labbe parasite (<i>Stercorarius parasiticus</i>)
Goéland cendré (<i>Larus canus</i>)	Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)	Labbe pomarin (<i>Stercorarius pomarinus</i>)
Goéland dominicain (<i>Larus dominicanus</i>)	Héron strié (<i>Butorides striata</i>)	Locustelle lusciniôide (<i>Locustella luscinioides</i>)
Goéland d'Audouin (<i>Ichthyaetus audouinii</i>)	Hirondelle à ailes tachetées (<i>Hirundo leucosoma</i>)	Locustelle tachetée (<i>Locustella naevia</i>)
Goéland leucophée (<i>Larus michahellis</i>)	Hirondelle à longs brins (<i>Hirundo smithii</i>)	Loriot doré (<i>Oriolus auratus</i>)
Goéland railleur (<i>Chroicocephalus genei</i>)	Hirondelle à ventre roux (<i>Cecropis semirufa</i>)	Mahali à calotte marron (<i>Plocepasser superciliosus</i>)
Gonolek de Barbarie (<i>Laniarius barbarus</i>)	Hirondelle de fenêtre (<i>Delichon urbicum</i>)	Malcoha à bec jaune (<i>Ceuthmochares aereus</i>)
Gonolek de Turati (<i>Laniarius turatii</i>)	Hirondelle de Guinée (<i>Hirundo lucida</i>)	Malimbe à bec bleu (<i>Malimbus nitens</i>)
Gonolek souffré (<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>)	Hirondelle de Preuss (<i>Hirundo preussi</i>)	Marabout d'Afrique (<i>Leptoptilos crumenifer</i>)
Gorgebleue à miroir (<i>Luscinia svecica</i>)	Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>)	Marouette à bec jaune (<i>Amaurornis flavirostra</i>)
Grand Indicateur (<i>Indicator indicator</i>)	Hirondelle des mosquées (<i>Cecropis senegalensis</i>)	Marouette de Baillon (<i>Porzana pusilla</i>)
Grand Labbe (<i>Stercorarius skua</i>)	Hirondelle fanti (<i>Psalidoprocne obscura</i>)	Marouette poussin (<i>Porzana parva</i>)
Grand-duc de Verreaux (<i>Bubo lacteus</i>)	Hirondelle ouest-africaine (<i>Cecropis domicella</i>)	Martin-chasseur à poitrine bleue (<i>Halcyon malimbica</i>)

Atlas ornithologique de la Casamance

Martin-chasseur à tête grise (<i>Halcyon leucocephala</i>)	Ouette d'Égypte (<i>Alopothen aegyptiaca</i>)	Pluvier fluviatile (<i>Pluvianus aegyptius</i>)
Martin-chasseur du Sénégal (<i>Halcyon senegalensis</i>)	Outarde à ventre noir (<i>Lissotis melanogaster</i>)	Pluvier à collier interrompu (<i>Charadrius alexandrinus</i>)
Martin-chasseur strié (<i>Halcyon chelicuti</i>)	Outarde du Sénégal (<i>Eupodotis senegalensis</i>)	Pluvier à front blanc (<i>Charadrius marginatus</i>)
Martin-pêcheur azuré (<i>Alcedo quadibrachys</i>)	Palmiste africain (<i>Gypohierax angolensis</i>)	Pluvier argenté (<i>Pluvialis squatarola</i>)
Martin-pêcheur géant (<i>Megaceryle maxima</i>)	Pélican blanc (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	Pluvier de Forbes (<i>Charadrius forbesi</i>)
Martin-pêcheur huppé (<i>Corythornis cristatus</i>)	Pélican gris (<i>Pelecanus rufescens</i>)	Pluvier doré (<i>Pluvialis apricaria</i>)
Martin-pêcheur pie (<i>Ceryle rudis</i>)	Percnoptère d'Égypte (<i>Neophron percnopterus</i>)	Pluvier grand-gravelot (<i>Charadrius hiaticula</i>)
Martin-pêcheur pygmée (<i>Ispidina picta</i>)	Perroquet youyou (<i>Poicephalus senegalus</i>)	Pluvier pâtre (<i>Charadrius pecuarius</i>)
Martinet cafre (<i>Apus caffer</i>)	Perruche à collier (<i>Psittacula krameri</i>)	Pluvier petit-gravelot (<i>Charadrius dubius</i>)
Martinet des maisons (<i>Apus affinis</i>)	Petit Indicateur (<i>Indicator minor</i>)	Pouillot de Bonelli (<i>Phylloscopus bonelli</i>)
Martinet des palmes (<i>Cypsiurus parvus</i>)	Petit Moineau (<i>Gymnoris dentata</i>)	Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)
Martinet d'Ussher (<i>Telacanthura ussheri</i>)	Petit-duc à face blanche (<i>Ptilopsis leucotis</i>)	Pouillot ibérique (<i>Phylloscopus ibericus</i>)
Martinet marbré (<i>Tachymarptis aequatorialis</i>)	Petit-duc africain (<i>Otus senegalensis</i>)	Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)	Phalarope à bec large (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	Poulette de roches (<i>Ptilopachus petrosus</i>)
Martinet pâle (<i>Apus pallidus</i>)	Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	Prinia à ailes rousses (<i>Heliolais erythropterus</i>)
Mélocichle à moustaches (<i>Melocichla mentalis</i>)	Phyllanthe capucin (<i>Phyllanthus atripennis</i>)	Prinia modeste (<i>Prinia subflava</i>)
Merle africain (<i>Turdus pelios</i>)	Piapiac africain (<i>Ptilostomus afer</i>)	Pririt à collier (<i>Platysteira cyanea</i>)
Mésange galonnée (<i>Melaniparus guineensis</i>)	Pic à dos brun (<i>Dendropicos obsoletus</i>)	Pririt du Sénégal (<i>Batis senegalensis</i>)
Milan d'Afrique (<i>Milvus aegyptius parasitus</i>)	Pic à queue dorée (<i>Campethera abingoni</i>)	Pygargue vocifer (<i>Haliaeetus vocifer</i>)
Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)	Pic à taches noires (<i>Campethera punctuligera</i>)	Râle des prés (<i>Crex egregia</i>)
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	Pic barré (<i>Campethera maculosa</i>)	Râle perlé (<i>Sarothrura pulchra</i>)
Moineau gris (<i>Passer griseus</i>)	Pic cardinal (<i>Dendropicos fuscescens</i>)	Rémiz à ventre jaune (<i>Anthoscopus parvulus</i>)
Moinelette à oreillons blancs (<i>Eremopterix leucotis</i>)	Pic goertan (<i>Dendropicos goertae</i>)	Rhynchée peinte (<i>Rostratula benghalensis</i>)
Monticole bleu (<i>Monticola solitarius</i>)	Pic gris (<i>Dendropicos elachus</i>)	Rolle violet (<i>Eurystomus glaucurus</i>)
Mouette à tête grise (<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>)	Pic tacheté (<i>Campethera nivosa</i>)	Rollier à ventre bleu (<i>Coracias cyanogaster</i>)
Mouette mélanocéphale (<i>Ichthyaelus melanocephalus</i>)	Pie-grièche à tête rousse (<i>Lanius senator</i>)	Rollier d'Abyssinie (<i>Coracias abyssinicus</i>)
Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	Pie-grièche méridionale (<i>Lanius meridionalis</i>)	Rollier varié (<i>Coracias naevius</i>)
Nicator du Sénégal (<i>Nicator chloris</i>)	Pigeon roussard (<i>Columba guinea</i>)	Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)
Nigrette à ventre roux (<i>Nigrityla bicolor</i>)	Pintade de Numidie (<i>Numida meleagris</i>)	Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)
Noircap Lorient (<i>Hypergerus atriceps</i>)	Pipit à dos uni (<i>Anthus leucophrys</i>)	Rousserolle africaine (<i>Acrocephalus baeticatus</i>)
Océanite tempête (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	Pipit à gorge rousse (<i>Anthus cervinus</i>)	Rousserolle effarvate (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)
Oie-armée de Gambie (<i>Plectropterus gambensis</i>)	Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	Rousserolle turdoïde (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)
Ombrette africaine (<i>Scopus umbretta</i>)	Pipit rousseline (<i>Anthus campestris</i>)	Salpornis de Salvadori (<i>Salpornis salvadori</i>)
Onoré à huppe blanche (<i>Tigriornis leucolopha</i>)	Piquebœuf à bec jaune (<i>Buphagus africanus</i>)	Sarcidiorne à bosse (<i>Sarkidiornis melanotos</i>)

Atlas ornithologique de la Casamance

Sentinelle à gorge jaune (<i>Macronyx croceus</i>)	Tisserin masqué (<i>Ploceus heuglini</i>)	Vautour de Rüppell (<i>Gyps rueppelli</i>)
Serin à croupion blanc (<i>Crithagra leucopygia</i>)	Tisserin minule (<i>Ploceus luteolus</i>)	Vautour fauve (<i>Gyps fulvus</i>)
Serin du Mozambique (<i>Crithagra mozambica</i>)	Tisserin pirate (<i>Ploceus nigricollis</i>)	Vautour oricou (<i>Torgos tracheliotos</i>)
Souimanga à collier (<i>Hedydipna collaris</i>)	Tisserin vitellin (<i>Ploceus vitellinus</i>)	Veuve dominicaine (<i>Vidua macroura</i>)
Souimanga à longue queue (<i>Cinnyris pulchellus</i>)	Torcol fourmilier (<i>Jynx torquilla</i>)	Veuve nigériane (<i>Vidua interjecta</i>)
Souimanga à poitrine rouge (<i>Chalcomitra senegalensis</i>)	Touraco gris (<i>Crinifer piscator</i>)	Zostérops jaune (<i>Zosterops senegalensis</i>)
Souimanga à tête verte (<i>Cyanomitra verticalis</i>)	Touraco vert (<i>Tauraco persa</i>)	Ædicnème du Sénégal (<i>Burhinus senegalensis</i>)
Souimanga à ventre jaune (<i>Cinnyris venustus</i>)	Touraco violet (<i>Musophaga violacea</i>)	Ædicnème tachard (<i>Burhinus capensis</i>)
Souimanga à ventre olive (<i>Cinnyris chloropygius</i>)	Tournepierre à collier (<i>Arenaria interpres</i>)	
Souimanga brun (<i>Anthreptes gabonicus</i>)	Tourtelette améthystine (<i>Turtur afer</i>)	
Souimanga cuivré (<i>Cinnyris cupreus</i>)	Tourtelette d'Abyssinie (<i>Turtur abyssinicus</i>)	
Souimanga éclatant (<i>Cinnyris coccinigastrus</i>)	Tourtelette masquée (<i>Oena capensis</i>)	
Souimanga olivâtre (<i>Cyanomitra olivacea</i>)	Tourterelle à collier (<i>Streptopelia semitorquata</i>)	
Souimanga pygmée (<i>Hedydipna platura</i>)	Tourterelle d'Adamaoua (<i>Streptopelia hypopyrrha</i>)	
Souimanga violet (<i>Anthreptes longuemarei</i>)	Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)	
Spatule blanche (<i>Platalea leucorodia</i>)	Tourterelle maillée (<i>Spilopelia senegalensis</i>)	
Spatule d'Afrique (<i>Platalea alba</i>)	Tourterelle pleureuse (<i>Streptopelia decipiens</i>)	
Sterne caspienne (<i>Hydroprogne caspia</i>)	Tourterelle rieuse (<i>Streptopelia roseogrisea</i>)	
Sterne caugek (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	Tourterelle vineuse (<i>Streptopelia vinacea</i>)	
Sterne de Dougall (<i>Sterna dougallii</i>)	Traquet à front blanc (<i>Oenanthe albifrons</i>)	
Sterne hansel (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	Traquet de Heuglin (<i>Oenanthe heuglini</i>)	
Sterne naine (<i>Sternula albifrons</i>)	Traquet familial (<i>Oenanthe familiaris</i>)	
Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)	Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	
Sterne royale (<i>Thalasseus maximus</i>)	Travailleur à bec rouge (<i>Quelea quelea</i>)	
Sterne voyageuse (<i>Thalasseus bengalensis</i>)	Travailleur à tête rouge (<i>Quelea erythrops</i>)	
Talève d'Afrique (<i>Porphyrio madagascariensis</i>)	Turnix d'Andalousie (<i>Turnix sylvaticus</i>)	
Talève d'Allen (<i>Porphyrio alleni</i>)	Vanneau à éperons (<i>Vanellus spinosus</i>)	
Tantale Ibis (<i>Mycteria ibis</i>)	Vanneau à tête blanche (<i>Vanellus albiceps</i>)	
Tarier des prés (<i>Saxicola rubetra</i>)	Vanneau à tête noire (<i>Vanellus tectus</i>)	
Tchagra à tête noire (<i>Tchagra senegalus</i>)	Vanneau du Sénégal (<i>Vanellus senegallus</i>)	
Tchitrec à ventre roux (<i>Terpsiphone rufiventer</i>)	Vanneau terne (<i>Vanellus lugubris</i>)	
Tchitrec d'Afrique (<i>Terpsiphone viridis</i>)	Vautour à tête blanche (<i>Trigonoceps occipitalis</i>)	
Tisserin à tête noire (<i>Ploceus melanocephalus</i>)	Vautour africain (<i>Gyps africanus</i>)	
Tisserin gendarme (<i>Ploceus cucullatus</i>)	Vautour charognard (<i>Necrosyrtes monachus</i>)	