

# Atlas ornithologique de la Casamance

Agrobate podobé ( <i>Cercotrichas podobe</i> )	Astrild queue-de-vinaigre ( <i>Estrilda caerulescens</i> )	Bergeronnette pie ( <i>Motacilla aguimp</i> )
Agrobate roux ( <i>Cercotrichas galactotes</i> )	Astrild-caille à lunettes ( <i>Ortygospiza atricollis</i> )	Bergeronnette printanière ( <i>Motacilla flava</i> )
Aigle botté ( <i>Hieraaetus pennatus</i> )	Autour de Toussenel ( <i>Accipiter toussenelii</i> )	Bihoreau à dos blanc ( <i>Gorsachius leuconotus</i> )
Aigle couronné ( <i>Stephanoaetus coronatus</i> )	Autour gabar ( <i>Micronisus gabar</i> )	Bihoreau gris ( <i>Nycticorax nycticorax</i> )
Aigle d'Ayres ( <i>Ayres's Hawk-Eagle</i> )	Autour noir ( <i>Accipiter melanoleucus</i> )	Blongios de Sturm ( <i>Ixobrychus sturmi</i> )
Aigle de Wahlberg ( <i>Hieraaetus wahlbergi</i> )	Autour sombre ( <i>Melierax metabates</i> )	Blongios nain ( <i>Ixobrychus minutus</i> )
Aigle fascié ( <i>Aquila spilogaster</i> )	Autour unibande ( <i>Kaupifalco monogrammicus</i> )	Bondrée apivore ( <i>Pernis apivorus</i> )
Aigle huppard ( <i>Lophaetus occipitalis</i> )	Avocette élégante ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	Bruant à ventre jaune ( <i>Emberiza affinis</i> )
Aigle martial ( <i>Polemaetus bellicosus</i> )	Bagadai casqué ( <i>Prionops plumatus</i> )	Bruant d'Alexander ( <i>Emberiza goslingi</i> )
Aigle ravisseur ( <i>Aquila rapax</i> )	Balbusard pêcheur ( <i>Pandion haliaetus</i> )	Brubru africain ( <i>Nilaus afer</i> )
Aigrette à gorge blanche ( <i>Egretta gularis</i> )	Barbican à poitrine rouge ( <i>Lybius dubius</i> )	Bucorve d'Abyssinie ( <i>Bucorvus abyssinicus</i> )
Aigrette ardoisée ( <i>Egretta ardesiaca</i> )	Barbican de Vieillot ( <i>Lybius vieilloti</i> )	Bulbul à barbe blanche ( <i>Criniger calurus</i> )
Aigrette garzette ( <i>Egretta garzetta</i> )	Barbican hérissé ( <i>Tricholaema hirsuta</i> )	Bulbul à bec grêle ( <i>Stelgidillas gracilirostris</i> )
Akalat à ailes rousses ( <i>Illadopsis rufescens</i> )	Barbion à croupion jaune ( <i>Pogoniulus bilineatus</i> )	Bulbul à gorge blanche ( <i>Phyllastrephus albicularis</i> )
Akalat brun ( <i>Illadopsis fulvescens</i> )	Barbion à croupion rouge ( <i>Pogoniulus atroflavus</i> )	Bulbul à gorge claire ( <i>Atimastillas flavicollis</i> )
Akalat de Puvel ( <i>Illadopsis puveli</i> )	Barbion à front jaune ( <i>Pogoniulus chrysoconus</i> )	Bulbul à moustaches jaunes ( <i>Andropadus latirostris</i> )
Alcin des chauves-souris ( <i>Macheiramphus alcinus</i> )	Barge à queue noire ( <i>Limosa limosa</i> )	Bulbul à queue rousse ( <i>Phyllastrephus scandens</i> )
Alecto à bec blanc ( <i>Bubalornis albirostris</i> )	Barge rousse ( <i>Limosa lapponica</i> )	Bulbul des jardins ( <i>Pycnonotus barbatus</i> )
Alèthe à huppe rousse ( <i>Alethe diademata</i> )	Bateleur des savanes ( <i>Terathopius ecaudatus</i> )	Bulbul des raphias ( <i>Thescelocichla leucopleura</i> )
Alouette bourdonnante ( <i>Mirafra rufocinnamomea</i> )	Baza coucou ( <i>Aviceda cuculoides</i> )	Bulbul fourmilier ( <i>Bleda canicapillus</i> )
Alouette chanteuse ( <i>Mirafra cantillans</i> )	Beaumarquet aurore ( <i>Pytilia phoenicoptera</i> )	Bulbul modeste ( <i>Chlorocichla simplex</i> )
Amadine cou-coupé ( <i>Amadina fasciata</i> )	Beaumarquet melba ( <i>Pytilia melba</i> )	Bulbul verdâtre ( <i>Eurillas virens</i> )
Amarante du Sénégal ( <i>Lagonosticta senegala</i> )	Bec-en-ciseaux d'Afrique ( <i>Rynchops flavirostris</i> )	Busard cendré ( <i>Circus pygargus</i> )
Amarante foncé ( <i>Lagonosticta rubricata</i> )	Bec-ouvert africain ( <i>Anastomus lamelligerus</i> )	Busard des roseaux ( <i>Circus aeruginosus</i> )
Amarante pointé ( <i>Lagonosticta rufopicta</i> )	Bécasseau cocorli ( <i>Calidris ferruginea</i> )	Busard pâle ( <i>Circus macrourus</i> )
Amarante vineux ( <i>Lagonosticta vinacea</i> )	Bécasseau maubèche ( <i>Calidris canutus</i> )	Busautour des sauterelles ( <i>Butastur rufipennis</i> )
Amblyospize à front blanc ( <i>Amblyospiza albifrons</i> )	Bécasseau minute ( <i>Calidris minuta</i> )	Buse d'Afrique ( <i>Buteo auguralis</i> )
Anaplecte écarlate ( <i>Anaplectes rubriceps</i> )	Bécasseau sanderling ( <i>Calidris alba</i> )	Buse variable ( <i>Buteo buteo</i> )
Anhinga d'Afrique ( <i>Anhinga rufa</i> )	Bécasseau variable ( <i>Calidris alpina</i> )	Butor étoilé ( <i>Botaurus stellaris</i> )
Anomalospize parasite ( <i>Anomalospiza imberbis</i> )	Bécassine des marais ( <i>Gallinago gallinago</i> )	Caille des blés ( <i>Coturnix coturnix</i> )
Anserelle naine ( <i>Nettapus auritus</i> )	Bécassine sourde ( <i>Lymnocyptes minimus</i> )	Calao à bec noir ( <i>Lophoceros nasutus</i> )
Apalis à gorge jaune ( <i>Apalis flavida</i> )	Becbleu sanguin ( <i>Spermophaga haematina</i> )	Calao à casque jaune ( <i>Ceratogymna elata</i> )
Astrild à joues orange ( <i>Estrilda melpoda</i> )	Bengali zébré ( <i>Amandaya subflava</i> )	Calao bréviaire ( <i>Lophoceros semifasciatus</i> )
Astrild cendré ( <i>Estrilda troglodytes</i> )	Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	Calao occidental ( <i>Tockus kemp</i> )

# Atlas ornithologique de la Casamance

Calao siffleur ( <i>Bycanistes fistulator</i> )	Cisticole à face rousse ( <i>Cisticola erythrops</i> )	Coucou solitaire ( <i>Cuculus solitarius</i> )
Camaroptère à dos vert ( <i>Camaroptera chloronota</i> )	Cisticole chanteuse ( <i>Cisticola cantans</i> )	Courlis cendré ( <i>Numenius arquata</i> )
Camaroptère à tête grise ( <i>Camaroptera brachyura</i> )	Cisticole de Dorst ( <i>Cisticola guinea</i> )	Courlis corlieu ( <i>Numenius phaeopus</i> )
Canard souchet ( <i>Spatula clypeata</i> )	Cisticole des joncs ( <i>Cisticola juncidis</i> )	Courvite à ailes bronzées ( <i>Rhinoptilus chalcopterus</i> )
Capucin bec-d'argent ( <i>Euodice cantans</i> )	Cisticole du Nil ( <i>Cisticola marginatus</i> )	Courvite de Temminck ( <i>Cursorius temminckii</i> )
Capucin nonnette ( <i>Lonchura cucullata</i> )	Cisticole rousse ( <i>Cisticola rufus</i> )	Crabier chevelu ( <i>Ardeola ralloides</i> )
Capucin pie ( <i>Lonchura fringilloides</i> )	Cisticole siffleuse ( <i>Cisticola lateralis</i> )	Cratérope à tête noire ( <i>Turdoides reinwardtii</i> )
Chevalier aboyeur ( <i>Tringa nebularia</i> )	Cochevis huppé ( <i>Galerida cristata</i> )	Cratérope brun ( <i>Turdoides plebejus</i> )
Chevalier arlequin ( <i>Tringa erythropus</i> )	Cochevis modeste ( <i>Galerida modesta</i> )	Crécerelle renard ( <i>Falco alopex</i> )
Chevalier cul-blanc ( <i>Tringa ochropus</i> )	Coliou huppé ( <i>Urocolius macrourus</i> )	Crombec sittelle ( <i>Sylvietta brachyura</i> )
Chevalier gambette ( <i>Tringa totanus</i> )	Colombar à front nu ( <i>Treron calvus</i> )	Crombec vert ( <i>Sylvietta virens</i> )
Chevalier guignette ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	Colombar waalia ( <i>Treron waalia</i> )	Cubla de Gambie ( <i>Dryoscopus gambensis</i> )
Chevalier stagnatile ( <i>Tringa stagnatilis</i> )	Combassou de Wilson ( <i>Vidua wilsoni</i> )	Dendrocygne veuf ( <i>Dendrocygna viduata</i> )
Chevalier sylvain ( <i>Tringa glareola</i> )	Combassou du Cameroun ( <i>Vidua camerunensis</i> )	Dos-vert à joues blanches ( <i>Nesocharis capistrata</i> )
Chevêchette perlée ( <i>Glaucidium perlatum</i> )	Combassou du Sénégal ( <i>Vidua chalybeata</i> )	Drongo de Lichtenstein ( <i>Dicrurus divaricatus</i> )
Choucador à longue queue ( <i>Lamprotornis caudatus</i> )	Combattant varié ( <i>Calidris pugnax</i> )	Drongo occidental ( <i>Dicrurus occidentalis</i> )
Choucador à oreillons bleus ( <i>Lamprotornis chalybaeus</i> )	Corbeau pie ( <i>Corvus albus</i> )	Échasse blanche ( <i>Himantopus himantopus</i> )
Choucador à queue violette ( <i>Lamprotornis chalcurus</i> )	Cordonbleu à joues rouges ( <i>Uraeginthus bengalus</i> )	Échenilleur à épaulettes rouges ( <i>Campephaga phoenicea</i> )
Choucador à ventre roux ( <i>Lamprotornis pulcher</i> )	Cormoran à poitrine blanche ( <i>Phalacrocorax lucidus</i> )	Échenilleur à ventre blanc ( <i>Coracina pectoralis</i> )
Choucador de Swainson ( <i>Lamprotornis chloropterus</i> )	Cormoran africain ( <i>Microcarbo africanus</i> )	Effraie des clochers ( <i>Tyto alba</i> )
Choucador pourpré ( <i>Lamprotornis purpureus</i> )	Corvinelle à bec jaune ( <i>Corvinella corvina</i> )	Élanion blanc ( <i>Elanus caeruleus</i> )
Choucador splendide ( <i>Lamprotornis splendidus</i> )	Cossyphé à calotte blanche ( <i>Cossypha albicapillus</i> )	Élanion nauler ( <i>Chelictinia riocourii</i> )
Chouette africaine ( <i>Strix woodfordii</i> )	Cossyphé à calotte neigeuse ( <i>Cossypha niveicapilla</i> )	Elminie bleue ( <i>Elminia longicauda</i> )
Chouette-pêcheuse de Pel ( <i>Scotopelia peli</i> )	Coucal à ventre blanc ( <i>Centropus leucogaster</i> )	Engoulevent à balanciers ( <i>Caprimulgus longipennis</i> )
Cigogne à pattes noires ( <i>Ciconia microscelis</i> )	Coucal du Sénégal ( <i>Centropus senegalensis</i> )	Engoulevent à épaulettes noires ( <i>Caprimulgus nigriscapularis</i> )
Cigogne blanche ( <i>Ciconia ciconia</i> )	Coucal noir ( <i>Centropus grillii</i> )	Engoulevent à longue queue ( <i>Caprimulgus climacurus</i> )
Cigogne d'Abdim ( <i>Ciconia abdimii</i> )	Coucou africain ( <i>Cuculus gularis</i> )	Épervier de Hartlaub ( <i>Accipiter erythropus</i> )
Cigogne noire ( <i>Ciconia nigra</i> )	Coucou criard ( <i>Cuculus clamosus</i> )	Épervier des Ovampos ( <i>Accipiter ovampensis</i> )
Circaète brun ( <i>Circaetus cinereus</i> )	Coucou de Klaas ( <i>Chrysococcyx klaas</i> )	Épervier shikra ( <i>Accipiter badius</i> )
Circaète cendré ( <i>Circaetus cinerascens</i> )	Coucou de Levailant ( <i>Clamator levailantii</i> )	Érémomèle à dos vert ( <i>Eremomela pusilla</i> )
Circaète de Beaudouin ( <i>Circaetus beaudouini</i> )	Coucou didric ( <i>Chrysococcyx caprius</i> )	Étourneau améthyste ( <i>Cinnyricinclus leucogaster</i> )
Circaète Jean-le-Blanc ( <i>Circaetus gallicus</i> )	Coucou foliotocol ( <i>Chrysococcyx cupreus</i> )	Euplecte à dos d'or ( <i>Euplectes macroura</i> )
Cisticole à ailes courtes ( <i>Cisticola brachypterus</i> )	Coucou geai ( <i>Clamator glandarius</i> )	Euplecte franciscain ( <i>Euplectes franciscanus</i> )
Cisticole à dos noir ( <i>Cisticola eximius</i> )	Coucou gris ( <i>Cuculus canorus</i> )	Euplecte monseigneur ( <i>Euplectes hordeaceus</i> )

# Atlas ornithologique de la Casamance

Euplecte vorabé ( <i>Euplectes afer</i> )	Gobemouche mésange ( <i>Myioparus plumbeus</i> )	Guifette noire ( <i>Chlidonias niger</i> )
Faucon à cou roux ( <i>Falco ruficollis</i> )	Gobemouche noir ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Gymnogène d'Afrique ( <i>Polyboroides typus</i> )
Faucon ardoisé ( <i>Falco ardosiaceus</i> )	Gobemouche pâle ( <i>Melaenornis pallidus</i> )	Héron à bec jaune ( <i>Ardea intermedia</i> )
Faucon crécerelle ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Goéland arctique ( <i>Larus Glaucoides</i> )	Héron cendré ( <i>Ardea cinerea</i> )
Faucon crécerellette ( <i>Falco naumanni</i> )	Goéland brun ( <i>Larus fuscus</i> )	Héron garde-bœufs ( <i>Bubulcus ibis</i> )
Faucon de Cuvier ( <i>Falco cuvierii</i> )	Goéland cendré ( <i>Larus canus</i> )	Héron goliath ( <i>Ardea goliath</i> )
Faucon hobereau ( <i>Falco subbuteo</i> )	Goéland dominicain ( <i>Larus dominicanus</i> )	Héron mélanocéphale ( <i>Ardea melanocephala</i> )
Faucon kobez ( <i>Falco vespertinus</i> )	Goéland d'Audouin ( <i>Ichthyaetus audouinii</i> )	Héron pourpré ( <i>Ardea purpurea</i> )
Faucon lanier ( <i>Falco biarmicus</i> )	Goéland leucophée ( <i>Larus michahellis</i> )	Héron strié ( <i>Butorides striata</i> )
Faucon pèlerin ( <i>Falco peregrinus</i> )	Goéland railleur ( <i>Chroicocephalus genei</i> )	Hibou du Cap ( <i>Asio capensis</i> )
Fauvette à tête noire ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Gonolek d'Abyssinie ( <i>Laniarius aethiopicus</i> )	Hirondelle à ailes tachetées ( <i>Hirundo leucosoma</i> )
Fauvette des jardins ( <i>Sylvia borin</i> )	Gonolek de Barbarie ( <i>Laniarius barbarus</i> )	Hirondelle à longs brins ( <i>Hirundo smithii</i> )
Fauvette grisette ( <i>Sylvia communis</i> )	Gonolek de Turati ( <i>Laniarius turatii</i> )	Hirondelle à ventre roux ( <i>Cecropis semirufa</i> )
Fauvette mélanocéphale ( <i>Sylvia melanocephala</i> )	Gonolek soufré ( <i>Chlorophoneus sulfureopectus</i> )	Hirondelle de fenêtre ( <i>Delichon urbicum</i> )
Fauvette passerinette ( <i>Sylvia inornata</i> )	Gorgebleue à miroir ( <i>Luscinia svecica</i> )	Hirondelle de Guinée ( <i>Hirundo lucida</i> )
Flamant nain ( <i>Phoeniconaias minor</i> )	Grand Indicateur ( <i>Indicator indicator</i> )	Hirondelle de Preuss ( <i>Hirundo preussi</i> )
Flamant rose ( <i>Phoenicopterus roseus</i> )	Grand Labbe ( <i>Stercorarius skua</i> )	Hirondelle de rivage ( <i>Riparia riparia</i> )
Fou brun ( <i>Sula leucogaster</i> )	Grand-duc ascalaphe ( <i>Bubo ascalaphus</i> )	Hirondelle des mosquées ( <i>Cecropis senegalensis</i> )
Fou de Bassan ( <i>Morus bassanus</i> )	Grand-duc de Verreaux ( <i>Bubo lacteus</i> )	Hirondelle fanti ( <i>Psalidoprocne obscura</i> )
Francolin à double éperon ( <i>Pternistis bicalcaratus</i> )	Grand-duc du Sahel ( <i>Bubo cinerascens</i> )	Hirondelle ouest-africaine ( <i>Cecropis domicella</i> )
Francolin à gorge blanche ( <i>Francolinus albogularis</i> )	Grande Aigrette ( <i>Ardea alba</i> )	Hirondelle paludicole ( <i>Riparia paludicola</i> )
Francolin d'Ahanta ( <i>Pternistis achantensis</i> )	Grèbe castagneux ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	Hirondelle rousseline ( <i>Cecropis daurica</i> )
Fuligule milouin ( <i>Aythya ferina</i> )	Grébifoulque d'Afrique ( <i>Podica senegalensis</i> )	Hirondelle rustique ( <i>Hirundo rustica</i> )
Fuligule morillon ( <i>Aythya fuligula</i> )	Grue couronnée ( <i>Balearica pavonina</i> )	Hirondelle striée ( <i>Cecropis abyssinica</i> )
Gallinule africaine ( <i>Paragallinula angulata</i> )	Guêpier à gorge blanche ( <i>Merops albicollis</i> )	Huîtrier de Moquin ( <i>Haematopus moquini</i> )
Gallinule poule-d'eau ( <i>Gallinula chloropus</i> )	Guêpier à gorge rouge ( <i>Merops bulocki</i> )	Huîtrier pie ( <i>Haematopus ostralegus</i> )
Ganga à ventre brun ( <i>Pterocles exustus</i> )	Guêpier à queue d'aronde ( <i>Merops hirundineus</i> )	Huppe fasciée ( <i>Upupa epops</i> )
Ganga quadribande ( <i>Pterocles quadricinctus</i> )	Guêpier de Perse ( <i>Merops persicus</i> )	Hylia verte ( <i>Hylia prasina</i> )
Gladiateur de Blanchot ( <i>Malaconotus blanchoti</i> )	Guêpier d'Europe ( <i>Merops apiaster</i> )	Hylote à ventre jaune ( <i>Hylota flavigaster</i> )
Glaréole à collier ( <i>Glareola pratincola</i> )	Guêpier écarlate ( <i>Merops nubicus</i> )	Hypolaïs ictérine ( <i>Hippolaïs icterina</i> )
Gobemouche à sourcils blancs ( <i>Fraseria cinerascens</i> )	Guêpier nain ( <i>Merops pusillus</i> )	Hypolaïs obscure ( <i>Iduna opaca</i> )
Gobemouche des marais ( <i>Muscicapa aquatica</i> )	Guêpier vert ( <i>Merops orientalis</i> )	Hypolaïs polyglotte ( <i>Hippolaïs polyglotta</i> )
Gobemouche drongo ( <i>Melaenornis edoloides</i> )	Guifette leucoptère ( <i>Chlidonias leucopterus</i> )	Ibis falcinelle ( <i>Plegadis falcinellus</i> )
Gobemouche gris ( <i>Muscicapa striata</i> )	Guifette moustac ( <i>Chlidonias hybrida</i> )	Ibis hagedash ( <i>Bostrychia hagedash</i> )

# Atlas ornithologique de la Casamance

Ibis sacré ( <i>Threskiornis aethiopicus</i> )	Martinet d'Ussher ( <i>Telacanthura ussheri</i> )	Perroquet à cou brun ( <i>Poicephalus fuscicollis</i> )
Indicateur de Wahlberg ( <i>Prodotiscus regulus</i> )	Martinet marbré ( <i>Tachymarpis aequatorialis</i> )	Perroquet youyou ( <i>Poicephalus senegalus</i> )
Indicateur tacheté ( <i>Indicator maculatus</i> )	Martinet noir ( <i>Apus apus</i> )	Perruche à collier ( <i>Psittacula krameri</i> )
Irrisor moqueur ( <i>Phoeniculus purpureus</i> )	Martinet pâle ( <i>Apus pallidus</i> )	Petit Indicateur ( <i>Indicator minor</i> )
Irrisor noir ( <i>Rhinopomastus aterrimus</i> )	Mégalure caquetteuse ( <i>Bradypterus baboecala</i> )	Petit Moineau ( <i>Gymnoris dentata</i> )
Jabiru d'Afrique ( <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> )	Mélocichle à moustaches ( <i>Melocichla mentalis</i> )	Petit-duc à face blanche ( <i>Ptilopsis leucotis</i> )
Jacana à poitrine dorée ( <i>Actophilornis africanus</i> )	Merle africain ( <i>Turdus pelios</i> )	Petit-duc africain ( <i>Otus senegalensis</i> )
Jacana nain ( <i>Microparra capensis</i> )	Mésange galonnée ( <i>Melaniparus guineensis</i> )	Phalarope à bec large ( <i>Phalaropus fulicarius</i> )
Labbe parasite ( <i>Stercorarius parasiticus</i> )	Messager sagittaire ( <i>Sagittarius serpentarius</i> )	Phragmite des joncs ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )
Labbe pomarin ( <i>Stercorarius pomarinus</i> )	Milan d'Afrique ( <i>Milvus aegyptius parasitus</i> )	Phyllanthus capucin ( <i>Phyllanthus atripennis</i> )
Locustelle lusciniotide ( <i>Locustella luscinioides</i> )	Milan noir ( <i>Milvus migrans</i> )	Piapiac africain ( <i>Ptilostomus afer</i> )
Locustelle tachetée ( <i>Locustella naevia</i> )	Moineau domestique ( <i>Passer domesticus</i> )	Pic à dos brun ( <i>Dendropicos obsoletus</i> )
Loriot doré ( <i>Oriolus auratus</i> )	Moineau doré ( <i>Passer luteus</i> )	Pic à queue dorée ( <i>Campethera abingoni</i> )
Loriot d'Europe ( <i>Oriolus oriolus</i> )	Moineau gris ( <i>Passer griseus</i> )	Pic à taches noires ( <i>Campethera punctuligera</i> )
Mahali à calotte marron ( <i>Plocepasser superciliosus</i> )	Moinelette à oreillons blancs ( <i>Eremopterix leucotis</i> )	Pic barré ( <i>Campethera maculosa</i> )
Malcoha à bec jaune ( <i>Ceuthmochares aereus</i> )	Monticole bleu ( <i>Monticola solitarius</i> )	Pic cardinal ( <i>Dendropicos fuscescens</i> )
Malimbe à bec bleu ( <i>Malimbus nitens</i> )	Mouette à tête grise ( <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> )	Pic goertan ( <i>Dendropicos goertae</i> )
Marabout d'Afrique ( <i>Leptoptilos crumenifer</i> )	Mouette mélanocéphale ( <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> )	Pic tacheté ( <i>Campethera nivosa</i> )
Marouette à bec jaune ( <i>Amaurornis flavirostra</i> )	Mouette rieuse ( <i>Chroicocephalus ridibundus</i> )	Pie-grièche à tête rousse ( <i>Lanius senator</i> )
Marouette de Baillon ( <i>Porzana pusilla</i> )	Nicator du Sénégal ( <i>Nicator chloris</i> )	Pie-grièche méridionale ( <i>Lanius meridionalis</i> )
Marouette ponctuée ( <i>Porzana porzana</i> )	Nigrette à ventre roux ( <i>Nigrita bicolor</i> )	Pigeon roussard ( <i>Columba guinea</i> )
Marouette poussin ( <i>Porzana parva</i> )	Noircap Loriot ( <i>Hypergerus atriceps</i> )	Pintade de Numidie ( <i>Numida meleagris</i> )
Martin-chasseur à poitrine bleue ( <i>Halcyon malimbica</i> )	Océanite de Wilson ( <i>Oceanites oceanicus</i> )	Pipit à dos uni ( <i>Anthus leucophrys</i> )
Martin-chasseur à tête grise ( <i>Halcyon leucocephala</i> )	Océanite tempête ( <i>Hydrobates pelagicus</i> )	Pipit à gorge rousse ( <i>Anthus cervinus</i> )
Martin-chasseur du Sénégal ( <i>Halcyon senegalensis</i> )	Oie-armée de Gambie ( <i>Plectropterus gambensis</i> )	Pipit des arbres ( <i>Anthus trivialis</i> )
Martin-chasseur strié ( <i>Halcyon chelicuti</i> )	Ombrette africaine ( <i>Scopus umbretta</i> )	Pipit rousseline ( <i>Anthus campestris</i> )
Martin-pêcheur azuré ( <i>Alcedo quadribrachys</i> )	Onoré à huppe blanche ( <i>Tigriornis leucolopha</i> )	Piquebœuf à bec jaune ( <i>Buphagus africanus</i> )
Martin-pêcheur géant ( <i>Megaceryle maxima</i> )	Ouette d'Égypte ( <i>Alopochen aegyptiaca</i> )	Pluvian fluviatile ( <i>Pluvianus aegyptius</i> )
Martin-pêcheur huppé ( <i>Corythornis cristatus</i> )	Outarde à ventre noir ( <i>Lissotis melanogaster</i> )	Pluvier à collier interrompu ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )
Martin-pêcheur pie ( <i>Ceryle rudis</i> )	Outarde du Sénégal ( <i>Eupodotis senegalensis</i> )	Pluvier à front blanc ( <i>Charadrius marginatus</i> )
Martin-pêcheur pygmée ( <i>Ispidina picta</i> )	Palmiste africain ( <i>Gypohierax angolensis</i> )	Pluvier argenté ( <i>Pluvialis squatarola</i> )
Martinet cafre ( <i>Apus caffer</i> )	Pélican blanc ( <i>Pelecanus onocrotalus</i> )	Pluvier de Forbes ( <i>Charadrius forbesi</i> )
Martinet des maisons ( <i>Apus affinis</i> )	Pélican gris ( <i>Pelecanus rufescens</i> )	Pluvier doré ( <i>Pluvialis apricaria</i> )
Martinet des palmes ( <i>Cypsiurus parvus</i> )	Percnoptère d'Égypte ( <i>Neophron percnopterus</i> )	Pluvier grand-gravelot ( <i>Charadrius hiaticula</i> )

# Atlas ornithologique de la Casamance

Pluvier pâtre ( <i>Charadrius pecuarius</i> )	Serin du Mozambique ( <i>Crithagra mozambica</i> )	Tisserin gendarme ( <i>Ploceus cucullatus</i> )
Pluvier petit-gravelot ( <i>Charadrius dubius</i> )	Souimanga à collier ( <i>Hedydipna collaris</i> )	Tisserin gros-bec ( <i>Ploceus superciliosus</i> )
Pouillot de Bonelli ( <i>Phylloscopus bonelli</i> )	Souimanga à longue queue ( <i>Cinnyris pulchellus</i> )	Tisserin masqué ( <i>Ploceus heuglini</i> )
Pouillot fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )	Souimanga à poitrine rouge ( <i>Chalcomitra senegalensis</i> )	Tisserin minule ( <i>Ploceus luteolus</i> )
Pouillot ibérique ( <i>Phylloscopus ibericus</i> )	Souimanga à tête verte ( <i>Cyanomitra verticalis</i> )	Tisserin pirate ( <i>Ploceus nigricollis</i> )
Pouillot véloce ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	Souimanga à ventre jaune ( <i>Cinnyris venustus</i> )	Tisserin vitellin ( <i>Ploceus vitellinus</i> )
Poulette de roches ( <i>Ptilopachus petrosus</i> )	Souimanga à ventre olive ( <i>Cinnyris chloropygius</i> )	Torcol fourmilier ( <i>Jynx torquilla</i> )
Prinia à ailes rousses ( <i>Heliolais erythropterus</i> )	Souimanga brun ( <i>Anthreptes gabonicus</i> )	Touraco gris ( <i>Crinifer piscator</i> )
Prinia modeste ( <i>Prinia subflava</i> )	Souimanga cuivré ( <i>Cinnyris cupreus</i> )	Touraco vert ( <i>Tauraco persa</i> )
Pririt à collier ( <i>Platysteira cyanea</i> )	Souimanga éclatant ( <i>Cinnyris coccinigastrus</i> )	Touraco violet ( <i>Musophaga violacea</i> )
Pririt du Sénégal ( <i>Batis senegalensis</i> )	Souimanga olivâtre ( <i>Cyanomitra olivacea</i> )	Turnepierre à collier ( <i>Arenaria interpres</i> )
Puffin du Cap-Vert ( <i>Calonectris edwardsii</i> )	Souimanga pygmée ( <i>Hedydipna platyura</i> )	Tourtelette améthystine ( <i>Turtur afer</i> )
Pygargue vocifer ( <i>Haliaeetus vocifer</i> )	Souimanga violet ( <i>Anthreptes longuemarei</i> )	Tourtelette d'Abyssinie ( <i>Turtur abyssinicus</i> )
Pyréneste gros-bec ( <i>Pyrenestes sanguineus</i> )	Spatule blanche ( <i>Platalea leucorodia</i> )	Tourtelette masquée ( <i>Oena capensis</i> )
Râle des prés ( <i>Crex egregia</i> )	Spatule d'Afrique ( <i>Platalea alba</i> )	Tourtelette tambourine ( <i>Turtur tympanistris</i> )
Râle perlé ( <i>Sarothrura pulchra</i> )	Sporopipe quadrillé ( <i>Sporopipes frontalis</i> )	Tourterelle à collier ( <i>Streptopelia semitorquata</i> )
Rémiz à ventre jaune ( <i>Anthoscopus parvulus</i> )	Sterne arctique ( <i>Sterna paradisaea</i> )	Tourterelle d'Adamaoua ( <i>Streptopelia hypopyrrha</i> )
Rhynchée peinte ( <i>Rostratula benghalensis</i> )	Sterne caspienne ( <i>Hydroprogne caspia</i> )	Tourterelle des bois ( <i>Streptopelia turtur</i> )
Rolle violet ( <i>Eurystomus glaucurus</i> )	Sterne caugek ( <i>Thalasseus sandvicensis</i> )	Tourterelle maillée ( <i>Spilopelia senegalensis</i> )
Rollier à ventre bleu ( <i>Coracias cyanogaster</i> )	Sterne de Dougall ( <i>Sterna dougallii</i> )	Tourterelle pleureuse ( <i>Streptopelia decipiens</i> )
Rollier d'Abyssinie ( <i>Coracias abyssinicus</i> )	Sterne d'Afrique ( <i>Thalasseus albidorsalis</i> )	Tourterelle rieuse ( <i>Streptopelia roseogrisea</i> )
Rollier varié ( <i>Coracias naevius</i> )	Sterne hansel ( <i>Gelochelidon nilotica</i> )	Tourterelle vineuse ( <i>Streptopelia vinacea</i> )
Rosignol philomèle ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	Sterne naine ( <i>Sternula albifrons</i> )	Traquet à front blanc ( <i>Oenanthe albifrons</i> )
Rougequeue à front blanc ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	Sterne pierregarin ( <i>Sterna hirundo</i> )	Traquet brun ( <i>Myrmecocichla aethiops</i> )
Rousserolle africaine ( <i>Acrocephalus baeticatus</i> )	Sterne voyageuse ( <i>Thalasseus bengalensis</i> )	Traquet motteux ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )
Rousserolle des cannes ( <i>Acrocephalus rufescens</i> )	Talève d'Afrique ( <i>Porphyrio madagascariensis</i> )	Travailleur à bec rouge ( <i>Quelea quelea</i> )
Rousserolle effarvate ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )	Talève d'Allen ( <i>Porphyrio alleni</i> )	Travailleur à tête rouge ( <i>Quelea erythrops</i> )
Rousserolle turdoïde ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> )	Tantale Ibis ( <i>Mycteria ibis</i> )	Turnix d'Andalousie ( <i>Turnix sylvaticus</i> )
Rufipenne de forêt ( <i>Onychognathus fulgidus</i> )	Tarier des prés ( <i>Saxicola rubetra</i> )	Vanneau à éperons ( <i>Vanellus spinosus</i> )
Salpornis de Salvadori ( <i>Salpornis salvadori</i> )	Tarier pâtre ( <i>Saxicola torquatus</i> )	Vanneau à tête blanche ( <i>Vanellus albiceps</i> )
Sarcelle d'été ( <i>Anas querquedula</i> )	Tchagra à tête noire ( <i>Tchagra senegalus</i> )	Vanneau à tête noire ( <i>Vanellus tectus</i> )
Sarcidiorne à bosse ( <i>Sarkidiornis melanotos</i> )	Tchitrec à ventre roux ( <i>Terpsiphone rufiventer</i> )	Vanneau du Sénégal ( <i>Vanellus senegallus</i> )
Sentinel à gorge jaune ( <i>Macronyx croceus</i> )	Tchitrec d'Afrique ( <i>Terpsiphone viridis</i> )	Vanneau terne ( <i>Vanellus lugubris</i> )
Serin à croupion blanc ( <i>Crithagra leucopygia</i> )	Tisserin à tête noire ( <i>Ploceus melanocephalus</i> )	Vautour à tête blanche ( <i>Trigonoceps occipitalis</i> )

# Atlas ornithologique de la Casamance

Vautour africain  
(*Gyps africanus*)  
Vautour charognard  
(*Necrosyrtes monachus*)  
Vautour de Rüppell  
(*Gyps rueppelli*)  
Vautour fauve  
(*Gyps fulvus*)  
Vautour oricou  
(*Torgos tracheliotos*)  
Veuve à collier d'or  
(*Vidua orientalis*)  
Veuve dominicaine  
(*Vidua macroura*)  
Veuve nigériane  
(*Vidua interjecta*)  
Zostérops jaune  
(*Zosterops senegalensis*)  
Edicnème du Sénégal  
(*Burhinus senegalensis*)  
Edicnème tachard  
(*Burhinus capensis*)  
Edicnème vermiculé  
(*Burhinus vermiculatus*)